HENRICI JOSEPHI COLLIN
NOSOCOMII PAZMANNIANI PHYSICI ORDINARII ET SAC.
CAESAREO = REG. APOST. MAJEST. REGIMIN. INFER.
AVSTRIAE CONSILIARII

CAMPHORAE VIRES

SIVE

OBSERVATIONVM CIRCA MORBOS ACVTOS ET CHRONICOS FACTARVM.

PARS TERTIA.

VIENNAE
APVD RVDOLPHVM GRAEFFER. 1773.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30532061_0003

VIRO
PERILLVSTRI MAGNIFICO
AC
CLARISSIMO
ANTONIO STÖRCK
AVGVSTISSIM.
IMPERATORIS ET IMPERATRI-
CIS, A CONSILIIS, ARCHIATRORVM
COMITI, STVDII MEDICI CAESAREO REG.
PRAESIDI ET DIRECTORI, NOSOCOMII PAZMAN-
NIANI PHYSICO, PLVRIVM ACADEMIARVM
MEMBRO &c. &c.

Has ſuas obſervationes, ſeque totum dicat.

H. J. Coll

PRÆFATIO.

Huic Opuſculo occaſionem dedit effectuum medicamentorum in variis morbis exhibitionem ſequentium diligens & a præjudiciis libera obſervatio, cujus eximia exempla in pie defuncto Illuſtriſſimo L. B. Gerardo van Swieten & Perilluſtri ac Magnifico Störck ſemper ob oculos habui: hunc enim non modo Ægris Noſocomii medicinam facientem ſecutus ſum, ſed & ad ſuos in Civitate Ægros eum comitari mihi licuit: Illuſtriſſimus autem pie defunctus Præſes ad mortem us-

que ſeverum & indefeſſum obſervatorem egit; me ad obſervandum ſtimulavit, gratiamque mihi fecit meos Ægros vel difficillimis vel incurabilibus habitis morbis laborantes ſaltem omni menſe, ſubinde etiam ſæpius, per undecim annos inviſendi meque in gravibus caſibus titubantem ſapientibus conſiliis erigendi firmandique. Ubi meam ex obſervatione fluentem de Camphora ſententiam illi aperui Ægroſque quos illa curabam oſtendi: norunt multi Medici, qui Noſocomium frequentarunt, quanta cum bonitate omnibus prius magna cum patientia examinatis, ſuam mihi ſententiam dixerit! & quantum me ſæpe, de felici curarum ſucceſſu

gaudens & humaniſſime gratulans, reverenti pudore ſuffuderit!

Multa ab anno 1762. cum practicis de Camphora Ægris exhibenda regulis & relatis ipſius effectibus minime convenientia in meos uſus notaveram. Verno autem tempore anni 1770. dum incipiens febris putrida petechialis adhuc ſporadica erat, & pleroſque libithina ad ſe rapiebat: aliquot hominibus morti jam traditis meæ de Camphora ſæpe repetitæ obſervationi innixus illam larga manu exhibui, eoſque miraculi inſtar ex orci faucibus eripui: ſtatui tunc de Camphora obſervationes majori cum exactitudine, non ob-

ſtan-

ſtante magno Ægrorum, quo incipiebam obrui, numero, ſcribere: ſelegique, ut plurimum, caſus, in quibus illius effectus magis oculis paterent, ut in obſcurioribus de illius viribus & ſecuro uſu melius poſſet ferri judicium. Hunc laborem boni conſule, Benevole Lector! & vale.

CAMPHORÆ VIRES.

CASUS PRIMUS.

Murarius 35. circiter annos natus 9 Junii anni 1770. ad nos defertur, a ſemi anno Opiſthotono affectus, & toto hoc tempore lecto affixus, immobilis, ſat libero functionum naturalium uſu gaudens.

Ante tres annos eodem morbo per plures menſes occupatus Balneis Badenſibus, quæ hoc anno ipſi nullum levamen attulerunt, curatus fuerat.

Tota vita ſua ante hunc morbum, vix unquam Æger, ſæpe tempore pluvioſo & frigido calci parandæ & aliis in libero aere perficiendis incubuit.

Pulſus erat tremulus, formicans, & 82. pulſationes intra horæ minutum cum modica arteriæ tenſione abſolvit; reſpiratio ob retrotractum caput, collum &c. & incurvatam dorſi ſpinam, per intervalla laborioſa, naturali tamen vix frequentior aut celerior; ſitis multa. datur ipſi medicam. N. 1. id eſt dr. ß. Camphor. per diem.

Hoc Medicamentum optime fert, & 12. Junii arteria intra minutum tantum 72. vel 73er pulſat: mollis eſt pulſus, liber collapſus, neque tremulus, neque formicans amplius. Calor ad ſenſum valde minutus; ſitis diſparuit; ſubinde per horam unam, duasve præcipue noctu æqualiter ſudat, & colli ſpinæque dorſi dolores inde minui ipſi videntur; ſomnus hac nocte optimus, quo gaviſus fuerit a ſemi anno.

Camphoræ dr. 1. quotidie ubſumit uſque ad 22. Junii; Calor fuit toto hoc tempore mi-

minor: cutis mollis, perſpirans: ſudor nullus & pulſus 8. 10. 12. pulſationibus minus creber, liberior, magis dilatatus fuit, quam ante Camphoræ Uſum: cum autem licet ſpinæ dorſi dolores remiſiſſent, Opiſthonus maneret immutatus, aliam curandi viam inivi, & Æger ſub finem Julii ſanus ad labores redivit.

CASUS SECUNDUS.

Rhedarius quadraginta aliquot annos natus, robuſtus, proceræ ſtaturæ vir, ſub finem Decembris anno 1769. Coxa ſiniſtra incepit valde dolere: ut non niſi baculo adjutus poſtea potuerit incedere. Varia in & externe incaſſum adhibita fuere remedia: Ultimo autem circa initium Maji anni 1770. Unguento carminativo locum dolentem incepit inungere: 15. ejusdem menſis dolor coxam reliquit, vertebras lumborum & Os

ſacrum tanta cum Vehementia occupavit, ut in artubus inferioribus omnis ſenſus & motus perierit: 18. ejusdem menſis ad nos delatus eſt.

Functiones natnrales ſat integræ; reſpiratio libera; pulſus vix febrilis, ſat plenus, valde mollis, debilis.

Varia ſecundum indicationem in & externe applicuimus medicamenta abſque effectu.

9. Junii continuant dolor & reliqua mala Ægrum cruciare: magnam debilitatem, nauſeam, capitis gravitatem doloremque & ſitim conqueritur; reſpiratio eſt anxia; pulſus febrilis, ſed debilis, mollis; oculi triſtes; facies ſordida, lurida. Præſcribitur Ipecacuanh. dr. ß. cum tartari Emetici gr. I. vomitu ſexies repetito cibos indigeſtos, & multum glutinis varie colorati reddidit. Aliquoties purgatus eſt, unde anxietas viſa

eſt

eſt minor. Poſthac mixtura vinoſa utitur: poſt Emeticum leniter fere continuo ſudat.

10. 11. nihil novi accidit.

12. hinc inde macula petechialis rubra apparet: Arteria tenſa, dilatata vix aliquid præter aerem continere videtur, & circiter 78ies intra minutum cum debilitate digitum ferit; Alvus & Urina naturalis; cutis continuo leniter madet: lingua ſicca, fuſceſcens; reliqua ut ante.

Datur Ægro Camphoræ dr. I. per diem, juſcula tenuia, & potus theiformis tepidus.

13. Camphoram optime fert: cœterum nihil novi.

14. Arteria libera; pulſus ſolideſcit, & tantum 75. pulſationes intra horæ minutum habet; Anxietas multum minuta; capitis dolor multum remiſit; oculi & faciei cutis nitidiores; lingua ut ante; ſudor lenis continuat; petechiis variæ figuræ & magni-

tudinis rubris, fuſceſcentibus totum corpus, excepta facie, obſitum eſt; ſitis nulla; alvus a biduo clauſa; Urina ſaturata, obſcuri valde coloris, cum Enæoremate multo ſuſpenſo. reliqua ut ante.

Nihil in methodo medendi mutatur, alvus 15. ſponte ſecedit cocta, mollis, ſubfuſca.

Res Ægri continuant ſenſim in melius vergere. Lingua depuratur: omnes functiones ſenſim ad ſtatum naturalem appropinquant, & 22. Junii petechiis fere omnibus flaventibus dolor in lumborum vertebris & oſſe ſacro multum remiſit; in artus inferiores redivit ſenſus, & utrûmque in lecto parum movere poteſt.

Continuat magna cum Euphoria ſuam Camphoræ dragmam quotidie abſumere; raro amplius ſudat.

7. Julii vix de doloribus aliquid ſupereſt; libere ſolus abſque baculo incedit; omnes functiones bonæ, & pulſus tantum 74. pulſationes intra horæ minutum habet. Continuat eandem medicamenti doſin ſumere.

12. Julii miſſus ſit camphoræ uſus & 14. ejusdem ſanus diſcedit.

CASUS TERTIUS.

Fœmina 48. annorum per 20. annos maritata ſterilis manſit: Catamenia ſemper pauca & irregularia habuit, quæ jam a tribus annis penitus emanſere: febribus intermittentibus & Eryſipelati crura præcipue invadenti doloribusque articulorum, pedum, & genuum per crura propagatis valde obnoxia, ſub finem anni 1769. doloribus vehementibus in Oſſe ſacro & ultimis lumborum vertebris corripitur, qui ad coxam ſiniſtram, inde vero exterius per femur ad apices

uſque digitorum pedis valde urentes & lancinantes extendebantur, ægramque maxima temporis parte lecto affixam tenebant. Crus & femur quaſi glacie involuta frigore, ſtupore affecta erant: & videbatur ipſi ſura ſæpius dilacerari.

Circa medium Majum anni 1770. é lecto nullo modo amplius ſurgere potuit: immo non niſi cum ſumma Dolorum exacerbatione corpus in lecto parum movere poterat: ſic continuavit affici uſque ad 18. Junii, qua ad nos deferebatur.

Ægram examinans inveni illam Iſchiade nervoſa, tam docte & perite â celeb. Cotunno deſcripta & elucidata affectam: Alvus erat tarda; præ doloribus ſæpius ſudabat; ſitis nulla: lingua humida, alba: appetitus bonus; toto capite frequenter dolet; ſomnus paucus, noctu ab auctis doloribus impeditus; reſpiratio naturali paulo crebrior,

ce-

celerior ; pulſus mollis, parvus, debilis, flacceſcens, tantum 50. pulſationes intra minutum habet.

19. Junii lene purgans ſumit, unde quinquies purgatur. 20. datur ipſi Camphoræ dr. ß. in mucilagine Gummi Arabici Syr. edulcorata; quotidie abſumenda.

Hanc doſin per ſex dies abſque notabili mutatione ſumit, & optime fert.

25. Camphoræ dr. 1. incepit ſumere vide Formul. N. 2.

26. gratiſſimum poſt ſumptum medicamentum, quod quadripartita doſi ipſi porrigitur, laudat refrigerium, quod ſequitur lenis ſudor per totum Corpus, per mediam horam, ſubin diutius, durans: pulſus magis dilatatus, liberior, 58. pulſationes intra minutum primum habet.

27. datur ipſi quadripartita doſi Camphoræ dr. 1. ß. vide N. 3. pulſus habet 61. pulſa-

ſationes intra minutum. reliqua ut ante.

28. fere tota nocte leniter ſudavit, & adhuc continuat; Dolores multum remiſere; per intervalla dormivit; reſpiratio naturalis; pulſus, liber, mollis ſolideſcit, & tantum 50. pulſationes intra horæ minutum habet.

30. Junii dolores valde minuuntur, & jam aliquoties hodie ſe ſola in latus ſiniſtrum vertit. & in illud per aliquot tempus decubuit.

3. Julii ſola e lecto ſurrexit, & aliquoties per cubiculum deambulavit; in lecto ſe erigit & facile ſedet: in latus affectum fere æque facile ac in aliud decumbit: loco dolorum ſenſum decurrentium formicarum ab Oſſe ſacro ad digitos pedis uſque percipit; continuat ſæpius leniter ſudare; arteria mollis, li-

be-

bera, dilatata, 54. vicibus intra horæ minutum pulſat.

Datur ipſi quater de die dr. ß. Camphoræ, quam optime fert, vide N. 4-

5. Julii pulſus ut nudiustertius: circiter vigeſies ab una parte cubiculi ad aliam libere inceſſit; ſomnus optimus; Alvus, enemate ſolicitata, colore & conſiſtentia bona; Urina ſtraminea, tenuis, cum nubecula fundum petente; vix amplius ſudat, ſitis nulla; calor ad tactum & ſenſum Ægræ temperatiſſimus.

7. Julii pulſus intra minutum 62. pulſationes habet. Nocte elapſa punctorius dolor mammam ſiniſtram per medium quadrantem horæ occupavit, ibi ceſſans ad lumbos delatus eſt, qui ibi per duo triave minuta moratus ſiniſtram Capitis partem cum leni auris tinnitu ſubito occupavit: Os ſacrum, vertebræ lumborum, coxa, femur

&

& totum crus omnino naturaliter habent. Alvo a nudius tertius mane caret; non ſudat.

Miſſa ſit Camphora: datur Ægræ Emulſum & Enema, ſequenti die diſparuit capitis dolor & auris tinnitus & Ægra continuat bene habere.

14. Julii pulſus mollis, liber, dilatatus, æqualis, 60. pulſationes intra horæ minutum habet: tenſionem in pectore percipit, omni anno menſe Majo venæ ſectionem celebrare conſuevit, quam hoc anno ob nimiam debilitatem omiſit.

Sanguis educitur ex brachio ad unc. x. qui refrigeratus inſulam bonæ conſiſtentiæ & coloris, tenui cruſta inflammatoria tectam debitæ ſeri quantitati innatantem præbuit, & Ægra poſt V. S. optime habens magnam partem diei per Agrum & pratum Noſocomii deambulat.

28. Julii ſana & robuſta ex Noſocomio exit.

CASUS QUARTUS.

Vir 43. annos natus 1. Junii anni 1770. ad nos delatus eſt.

A 24. ætatis anno febribus acutis, pleuritide, arthritride diuturna frequenter vexatus fuit.

15. Menſis Maji hujus anni cum jam per allquot ſeptimanas minus bene habuiſſet, prægreſſa laſſitudine ſpontanea, magna debilitate, anxietate doloribus lancinantibus, dilacerantibus in utriusque pedis dorſo incipientibus & ad coxam uſque propagatis affectus eſt: incipientibus doloribus utriusque pedis dorſum intumeſcebat: hic tumor ſenſim cum dolore auctus demum diſparebat, dum ad ſummam intenſitatem pervenerat dolor, Ægrum fere in convulſiones agens:

ſic

ſic per mediam horam & ultra durabat, poſtea remittens abſque intermiſſione, frequenter irregularibus intervallis exacerbandus: noctu intenſior quam de die. Similis dolor & tumor eodem modo procedens, digitos & dorſum utriusque manus occupans ad articulationem brachii inferioris cum Oſſibus carpi protendebatur, ingentes dolores vertebras lumborum & Os ſacrum occupabant: Lecto affixus, immobilis variis uſus eſt abſque levamine, donec I. Junii ad nos deferretur.

Vir toroſus, robuſtus ita macer eſt, ut couſumptis carnibus cutis tantum Oſſibus hærere videatur: unguibus incurvis: oculis in orbitarum cavis profunde hærentibus: cuti colore obſcure flavo tincta.

Gingiviæ cœruleæ; dentes ſordidi, denudati, vacillantes.

Ca-

Caput grave, obtuſe præcipue circa frontem dolens.

Somnus paucus; appetitus nullus, ſitis nulla; lingua humida; alvus naturalis, omni alterno die ſecedere ſolita; Urina ſtraminea cum Enæoremate fundum petente, ſubinde aquoſa, tenuis; reſpiratio facilis, naturali paulo frequentior; pulſus inæqualis, valde mollis, parvus; arteria ſubinde tenſa, Plerumque intra minutum 90ies digitum ferit.

Curam hujus Ægri uſque ad vigeſimam Junii variis Medicamentis, Decoctis depurantibus, diaphoreticis, purgantibus, ſero lactis &c. levamine ſubinde apparente ac brevi iterum diſparente, tentavimus.

21. Camphoræ Scr. I. per diem in Emulſo datur, quam libenter ſumit. 23. datur dr.

ß.

ß. 25. dr. 1. per diem quatuor doſibus in mucilagine incipit abſumere.

26. Junii nocte elapſa melius dormivit, continuo ſudore leni per totum Corpus æquali madens, qui circa matutinum tempus remiſit, & circa ſeptimam per horam factus eſt copioſus: gratiſſimum per totum corpus refrigerium laudat, tactui etiam manifeſtum; Caput levius habet; Dolores omnes multo minores ſunt; ſe ſolus erigit, & qui vix pedem in lecto movere poterat, ſolus ex Lecto ſurrexit. Pulſus ut ante, ſubinde adhuc parum tenſus, 86. pulſationibus intra minutum abſolvitur. Quadripartita Doſi Camphor dr. I. ß. per diem abſumat.

28. Junii continuat per intervalla leniter ſudare; functiones reliquæ naturales bonæ. Dolores ita minuti ſunt, ut heri bis abſque fulcro ab una parte cubiculi ad aliam inceſſerit: manibus quæcunque prehendit, ſat forti-

titer tenet: circa mediam noctem aure dextra per ſemi horam doluit: hic dolor oborto ſecundum ſpinam dorſi copioſo ſudore ceſſavit, & Æger ſat bene poſtea dormivit. Pulſus liber, dilatatus, mollis; arteria 74er intra minutum digitum ferit.

29. & 30. Junii vix amplius ſudat: Caput adhuc grave eſt: arteria libera, 70ies pulſat intra minutum Sumat quater de die Camphor dr. ß.

Hanc doſin bene fert: 3. Julii artus inferiores, Os ſacrum & lumbares vertebræ ab omni Dolore libera ſunt: Artus ſuperiores quoque liberi, exceptis humeris, in quibus obtuſum dolorem conqueritur: noctu optime dormit, ſubin leni aurium tinnitu affectus: greſſus facilis, liber eſt: Pulſus liber, mollis 78. pulſationes intra minutum habet, pergit eandem medicamenti doſin quotidie abſumere.

Nocte tertiæ ad quartam Julii cum debilitate & pandiculatione plus ſolito incaluit: acceſſere abdominis tormina: poſt quadrantem horæ erupit ſudor per totum Corpus æqualis, circiter bihorio durans: quo finito incepere carnes ſurarum & femorum tremere, ſicque continuaverunt per 20. horæ minuta manſit poſt hæc Æger vigilans optime habens per quadrantem horæ; dein in placidum ſomnum lapſus eſt.

4. Julii pulſus 70. pulſationibus intra minutum abſolvitur, eſt plenus, ſolidus, dilatatus, liber. quo ad omnia bene habet: Camphoram valde nauſeat, & poſt illam aſſumptam calorem ad caput aſcendentem, & frontis tenſionem leniter dolorificam conqueritur. Miſſus ſit Camphoræ Uſus.

5. 6. 7. Julii ſæpe leniter ſudat 8. nihil morboli ſupereſſe videtur: ipſæ Gingivæ firmæ,

mæ, coloris boni ſunt: dentes nitidiſſimi: Carnes ſenſim corpori emaciato renaſcuntur: omnes functiones bonæ. conceditur ipſi carnium eſus.

20. Julii optime valens & fortis dimiſſus eſt.

CASUS QUINTUS.

Septuagenarius Muſicus ſemper utcumque ſanus vixit: ſpaſmodicis tamen & flatulentis hypochondriorum & abdominis affectibus ac torminibus præcipue poſt olerum & leguminum comeſtionem frequenter obnoxius.

Tota fere æſtate elapſa valida laboravit tuſſi, qua vix aliquid excernebatur, & quæ variis adhibitis adpropinquante Autumno demum ceſſavit.

Ante ſeptem ſeptimanas medium femur ſiniſtrum invaſit dolor urens, lancinans,

diurno tempore major, quam de nocte, ad ſuram, Malleolos & dorſum pedis protractus, greſſum difficilem reddens.

Decoctis ſic dictis, ſanguinem depurantibus per quatuor ſeptimanas uſus nullo modo levatus eſt: immo é lecto ſurgere amplius non potuit. Domi modo hoc, modo illud adhibens remedium, permanſit donec 30. Junii anni 1770. ſe ad noſtrum Noſocomium curavit deferri.

Habitus corporis eſt valde macilentus, Cachecticus: tuſſitat ſubinde: appetitus bonus, ſitis nulla; dorſum pedis ſiniſtri & uterque malleolus tument, dura ſunt, dolent; planta pedis ita ſenſilis, ut illi præ dolore inſiſtere nequeat; genu mole auctum, non dolens, dum ſolito magis incaleſcit Ægro ſenſum formicationis cauſat, ſub poplite omnia rigida ſunt; ſura tenſa eſt, dolens: quibus extenſio cruris impeditur.

Re-

Reſpiratio libera: pulſus ſunt ſpatio minuti 100. vel plures, molles, parvi, debiles, ſnbinde tenſi: Mercurius in Thermometro Fahrenheitiano per quadrantem horæ ante 10. matutinam ſub axilla applicato exacte ad gradum 98. adſcendit.

Datur per diem Camphoræ dr. ß. quam optime abſque mutatione fert.

3. Julii quater de die Camphoræ gr. xv. ſumit.

5. Julii pulſus fere ut ante, paulo magis dilatatus: applicatum ut ante Thermometrum, grad. caloris 96½. notat; Cutis mollis, perſpirans.

7. Julii ſomnus melior, protractior ſolito: Dolores ubique multum minuti: ſura minus tenſa: tendines ſubpoplitei minus rigidi: Urina rubra, Alvus naturalis; ſudor nullus; ſitis nulla; pulſus dilatatus, mollis, liber, 83. pulſationes intra minutum primum habet.

 bet.

bet. Thermometrum applicatum caloris gradus 97. exhibet. Datur quater in die Camphoræ dr. ß.

8. & 9. Julii mane Thermometrum eundem caloris gradum notat ac præcedentibus diebus: aitque Æger ſe poſt aſſumptum medicamentum nullum incommodum pati; lingua naturalis; ſitis nulla; ſudor nullus.

Poſt meridiem per mediam horam doloribus punctoriis Hypochondrii dextri & tunc diſtenti abdominis Borborygmis affectus eſt: alvum a nudiustertius non depoſuit: pulſus eſt tenſus, reſiliens, inæqualis, irregularis, intra minutum 86. pulſationes complens: datum Enema has turbas ſtatim abſtulit: ſomnus eſt bonus & omnia continuant in melius mutari, pergit quotidie dr. II. Camphoræ abſumere.

17. Julii Pulſus 80. intra horæ minutum molles, liberi, dilatati: grad. caloris

96.

96. notat Thermometrum more ſolito applicatum.

20. crus libere extendit: diſparuere tenſiones, tumores, dolores: Pedi inſiſtere poteſt: ſomnus bonus, protractus, in quo nunc leniter ſudat: pulſus plenus, ſolidus, mollis, dilatatus 78. pulſationes intra minutum primum præbet: gradus caloris Thermometro per quadrantem horæ applicato eſt, ut 17.

Abſtinet Æger a Medicamento: cibis congruis utitur, & circa medium Auguſti ſanus dimittitur.

CASUS SEXTUS.

Puella 27. annos nata 26. Julii anni 1770. ad nos delata eſt.

A pueritia febribus intermittentibus ſponte ſemper ceſſantibus frequenter affecta ante ſex annos in profundum lapſa præcipitium

multum ſanguinis per triduum ore reddidit: convaluit nullis adhibitis remediis.

A verno tempore anni 1769. frequenter nullo alio prægreſſo ſymptomate convellitur cum integra mentis alienatione: Menſtruis caruit ad ultimam Maji anni 1770. quæ, completo jam 24. ætatis anno, poſt validum convulſionis puraxyſmum, prima vice eruperunt, & copioſa per triduum fluxerunt: quibus non obſtantibus ante finem Junii adhuc bis convulſa fuit.

Circa medium Aprilem ejusdem anni, ex curru, quo vehebatur, lapſæ crus dextrum, prope malleolum internum, valde contuſum, excoriatum eſt, & in ulcus abivit: quod variis applicatis videbatur brevi cicatrice obducendum. Cecidit autem iterum 17. Junii ex alta, quam conſcenderat, ſcala & idem crus denuo multum læſit: unde ulcus denuo latius evaſit, & incepit hypo-

chon-

chondrio ſiniſtro multum dolere. hoc modo adhuc affecta poſt inſtitutam V. S. & ſumptum purgans ad nos defertur.

Pulſus eſt mollis, parvus & tantum 66. pulſationes intra minutum primum præbet. Reſpiratio, ob Hypochondrii dolorem parum læſa: dantur medicamenta leniter ſolventia, paregorica & talia externe applicantur: Ulcus ſaniem dans antiſepticis deligatur.

Prima Julii Crus totum tumet; profunde rubet, tenſum eſt, & Ulcus fuſcum, ſiccum eſt: Pulſus frequentia irregularis uno minuto ſeptuaginta altero 80. pulſationes exhibens, valde mollis, flacceſcens: Thermometrum per quadrantem horæ applicatum 98. Grad. caloris notat. Datur Camphoræ dr. ß. per diem abſumenda.

2. Julii omnia in eodem ſtatu permanent: malum non eſt auctum: dantur quater de die Camphoræ gr. xv.

Ulceri gangrænoſo præter Emplaſtrum diapalm. nihil applicatur: frequenter inviſitur Ægra, ne forte ingraveſcente malo hac methodo aliquid negligatur, & ſi opus ſit, alia medicamenta illi porrigantur: verum viſa eſt potius in melius parum mutari.

Tertia Julii Crus minus rubrum, minus tumidum, minus dolens: Ulcus humeſcit, & in circumferentia videtur cruſta elevari. Thermometrum per 20. & ultra horæ minuta in Cavo ſubaxillari applicatum caloris gradum 97. exhibet: Pulſus adhuc irregularis, modo 54. modo 60. mox etiam 72. pulſationes intra minutum præbens: ſed ſolideſcit, fortior eſt: reſpiratio minus frequens, fere naturalis: licet adhuc doleat Hypochondrium.

Continuat eadem Medicamenti doſi uti, rebus ſenſim in melius Vergentibus.

Quinta Julii, idem Caloris gradus; Pulſus magis regularis, dilatatus, liber, 63. pulſa-

tio-

tiones intra minutum habet: dolor partem anteriorem hypochondrii occupans retrorſum prope dorſi ſpinam translatus eſt, & ſubinde intermittit: Crus multum collabitur, & fere ubique ſuppurat Ulcus; Urina & Alvus naturales ſponte excernuntur; cutis mollis, perſpirans; ſudor nullus; ſitis nulla; lingua pura; appetitus bonus; ſomnus vero paucus. continuetur eadem Camphoræ doſis.

Septima Julii crus penitus detumuit, Colore naturali præditum: Ulcus cavum, purum, ubique copioſum, optimum pus dat: heri tamen convulſa fuit. Pulſus ſunt 55. intra minutum primum: in Thermometro Fahrenheitiano more ſolito applicato Mercurius ad gradum 96. adſcendit, ſic etiam octava: nona ad 95. ſic uſque ad 16. Julii, qua tantum 94. caloris gradus notat. Pulſus liber, dilatatus, ſolidus, fere ſemper 60. 62. pulſationes intra minutum primum

ex-

exhibet: diſparuit omnis dolor: cavitas Ulceris tota impleta eſt, & media ſuperficies cicatrice obducta.

Continuatur Camphoræ uſus, ea ſpe, fore ut forte convulſionibus medeatur & menſtrua ab ultima Maji emanentia promoveantur: verum 27. Julii Medicamentum nauſeat: dantur ipſi Scr. II. per diem cum ſucco liquiritiæ in pilulas redacti: verum nec ſic poteſt ſumere, & ſi ſe cogat, vertiginoſa fit: hinc illi ſuperſeditur. Pulſus eſt plenus, liber, omni nota ſanus.

Tertia Auguſti cum jam per ſex dies a Camphora abſtinuiſſet, more ſolito convulſa eſt: Ulcus perfecte Cicatrice obductum, & totum Corpus ſanitatem præ ſe fert.

Utitur Antiſpaſmodicis, nervinis &c. ad finem uſque Auguſti, ſub quorum uſu adhuc ſemel convulſa eſt.

6.

6. Septembris licet menſtrua evacuatio nulla promoveri potuerit, robuſta, optimo colore prædita ex Noſocomio exit.

Quinta Julii incepit Ulceri gangrænoſo applicari mucilago N. 5. & continuata eſt donec Ulcus fuerit cicatrice obductum.

CASUS SEPTIMUS.

Puella 28. annos nata, decimo ætatis anno variolavit, ingenti puſtularum agmine tecta, quarum conferta veſtigia in facie proſtant.

Annos nata 17. prima menſtrua acquiſivit, quæ, ut ait, debite fluxere ad ætatis ſuæ annum 27.

24. annos nata vehementiſſimo dolore ſiniſtram capitis partem occupante per aliquot dies affecta eſt. Sub quo in Oſſe temporali tumor medii Ovi gallinacei longitudinaliter diviſi figura & magnitudine, brevi duritie

Oſſea

Oſſea tactui reſiſtens, Ortus Hemicraniam multum lenivit.

Tumor ille neglectus poſt medium annum ſponte diſparuit, & Ægra atrociſſima Cephalalgia, qua, per vices præcipue nocturno tempore, fere in furorem agebatur, correpta eſt: quæ variis medicamentis & maxime bis repetita cum ſcarificatione cucurbitularum ſeptem retro aures & ad Nucham applicatione diſparuit.

Initio anni 1769. ſcabie humida totum Corpus occupatum eſt, quam, præmiſſo purgante, in unctione quadam circa artuum articulos quotidie per ſex ſeptimanas continuata retropulit.

Menſe Martio ſequente Pleuritide correpta eſt, quæ V. S. curata menſe Aprili illam denuo invaſit, venæ ſectione iterum ſublata.

Ab illo tempore menſtrua quoad quantitatem, qualitatem & tempus fuere irregularia.

ria. Fluore albo frequenter affecta fuit, ut ajebat, nunquam urente.

Circa medium Octobris ejusdem anni Os ſacrum & coxam dextram vehemens, lancinans, dilacerans dolor invaſit, & inde per femur & exteriorem cruris partem ad digitos uſque pedis æque acerbus propagatus eſt: genu intumuit ita, ut non niſi cum magnis doloribus crus vel flectere vel extendere poſſet.

Variis in & externe adhibitis aliquod levamen nacta eſt, & ſua utcumque peragere potuit; donec circa finem Januarii anni 1770. ex ſede, cui inſidebat, ſurgere volens ceciderit: tunc enim omnia exacerbata fuere: genu maxima parte collapſum, iterum intumuit, & Iſchiadi nervoſæ adjuncta eſt pleuritis, quæ methodo antiphlogiſticæ ceſſit, manentibus diriſſimis Iſchiadis ſymptomatibus, quibuscum 12. Martii anni 1770. ad nos delata eſt.

Uſque ad tertiam Julii varia & optima adhibita medicamenta, veſicantia aliquoties repetita ſubinde aliquod levamen attulerunt, morbum vicerunt nunquam. Caput ſæpe dolet; menſtrua manent irregularia, aquoſa, & illa per plures dies præcedit & ſequitur fluor albus. pallidus, & gracilis eſt corporis habitus; appetitus bonus; Alvus & Urina naturales.

Tertia Julii Camphoræ dr. ß, quotidie abſumenda præſcribitur: antequam primam adſumat medicamenti doſin Thermometrum per 20. horæ minuta applicatum notat gradum 97. Pulſus parvus cum aliqua tenſione, mollis, variis vicibus examinatus 84. 85. 88. pulſationes intra horæ minutum exhibet.

Quinta Julii, Pulſus plerumque 70. tantum pulſationes intra minutum habet. Thermometrum eundem caloris gra-

gradum notat ac nudiustertius. Datur ipſi Medicam. N. 2.

6. 7. 8. idem caloris gradus: pulſus idem.

10. pulſus variis vicibus examinatus 60. 64. 66. pulſationes intra horæ minutum præbet. Gradus Mercurii in Thermometro eſt 96.

Sequentibus diebus continuata eadem Camphoræ doſi, caloris gradus ſunt 97. pulſus ut ante uſque ad 16. Julii, qua Thermometrum Caloris grad. 100. notat, more ſolito applicatum: pulſationes Arteriæ tempore conſueto ſunt 80. 86. Ægra â Camphora nullum omnino levamen habet.

17. Julii dantur Ægræ Mercurii dulcis grana v. quadripartita doſi quotidie abſumenda.

Abſumpta hujus dr. ß. incepit ſalivare, & per ſex ſeptimanas continuata ſalivatione perfecte curata eſt.

Initio Septembris menſtrua debita quantitate & qualitate per ſex dies fluxerunt, & 13. ejusdem ſana dimiſſa eſt.

CASUS OCTAVUS.

Quindecim annorum ſutoris Tyro ab aliquot annis frequentibus narium Hæmorrhagiis, quas cephalalgia modo brevioris modo diuturnioris durationis ſemper ſubſequitur, obnoxius, quater Arthitide, qua omnes artus articuli tumentes, immobiles fiebant, ſpatio duorum annorum correptus, ſuffumigiis & paucis interne adhibitis medicamentis ſemper ſat cito curatus eſt.

Ab aliquot annis (annum enim determinare nequit) ſpeciei cuidam convulſionis, qua uterque oculus mire rotatur cum faciei rubore obnoxius eſt: hoc per aliquot horæ minuta durat: dein caput anterius collabitur oculis clauſis: totus paroxyſmus circiter intra quadrantem horæ abſolvitur, & quan-

do-

doque ſæpius de die redit. Cauſam tribuit terrori magno, quo non diu ante primum paroxyſmum perculſus fuit.

Hoc anno 1770. tempore Bacchanalium apud nos decubuit, & curatus dimiſſus eſt, emanſitque paroxyſmus ultra tres menſes, donec 20. Junii elapſi ligna empturus tempeſtate valde pluvioſa ſummo mane in tenebris exeuns in obſtaculum ligneum. impegerit, unde multum territus fuit & ſequenti die paroxyſmus illum denuo invaſit, quo ab eo tempore quotidie ſemel, quandoque bis impetitur.

3. Julii ad nos delatus eſt, bis in itinere ad noſocomium paroxyſmum paſſus.

Circa ſinus frontales dolorem magnum conqueritur, & magnam in ſudores, propenſionem.

Thermometrum Fahrenheitianum bihorio poſt ſuum in noſocomium ingreſſum in cavo ſubaxillari per 20. horæ minuta retentum

tum Ægro adhuc jejuno, 99. caloris gradum notat. Pulſus rithmo & tempore inæqualis, irregularis omni fere minuto pulſationum numero varians, ut modo 70. modo 70. aliquot numerentur: maximus tamen numerus eſt 80. valde mollis eſt & ſat dilatata arteria, reliquæ functiones ſat bonæ: in Hypochondrii dextri media parte, minime tenſa, ab attactu dolet: datur ipſi purgans & 4. Julii incipit Camphoræ dr. ß. per diem abſumere quam optime fert: quare 6. ejusdem dantur gr. xv. quater diei tempore.

7. Julii pulſus liber, mollis, ſubundulans, minus inæqualis 77. pulſationibus horæ minutum explet: Frontis & Hypochondrii dolor ut ante: latus pectoris ſiniſtrum ſubinde dolor prehendit ad ſternum extenſus, fugax, cito evanidus. Leniter, ſed fere continuo ſudat. ſtat Mercurius in Thermometro applicato ad gradum 97. omnes functiones bonæ: Paroxyſmus more ſolito redit.

De-

Detur ter de die Camphoræ dr. ß. ſive Medicam. N. 3.

8. 9. Julii idem pulſus: caloris grad. paulo infra 97.

10. Julii Thermometrum mane & veſpere applicatum notat ſemper grad. 98. Pulſus characteres ut ante, cujus pulſationes intra minutum numero 64. comprehenduntur. Poſt aſſumptam quamque medicamenti doſin, ait quaſi ebrium ſe fieri, manereque ſic per mediam horam: Dolor circa ſinus frontales & Hypochondrium idem: bene dormit: leniter ſudat: quoad reliqua pergit bene habere: continuat quotidie Camphoræ dr. 1. ß. abſumere, ſed ſexpartita doſi; ſic nulla amplius ebrietas ipſius aſſumptionem ſequitur.

12. Julii oculorum convulſio, quæ a 7. ejusdem abfuerat, denuo apparuit, ſed tantum per duo horæ minuta duravit. omnia ut ante.

14. Julii brevis convulſio oculorum iterum adfuit. Pulſus valde inæqualis poſt tres quatuorve pulſationes valde præcipites, plures alias habet valde raras, inter quas una intercurrit valde tarda, quaſi pars Arteriæ tangenti digito reſpondens tenaci quadam materia internæ arteriæ parti fere agglutinata vix amplius dilatari poſſet: hasque inæqualitates non ſemel ſed decies examinatus pulſus ſemper exhibet: utrumque Hypochondrium leniter tenſum, dolorificum eſt, frons ut ante dolet. Detur Hauſtus purgans: Mercurius in Thermometro non exacte ad 98. gradum adſcendit.

15. levata ſunt Hypochondria: pulſus liberior, minus inæqualis; minime febrilis: Calor Thermometro menſuratus idem, ac ante.

Omnia bene pergunt ad 18. Julii, qua iterum convelluntur oculi, paroxyſmo æque diu durante ac dum ad nos venerat: Calor

idem;

idem ; pulſationes intra minutum circa 70.

Perrexit eadem Camphoræ doſi uti uſque ad 28. Julii, Pulſus circiter 56ies intra minutum digitum feriens eosdem characteres ſervat, ac 14. Julii: continuat redire paroxyſmus convulſivus: Dolor circa ſinus frontales idem permanet. cœterum quoad reliqua Æger bene habere videtur.

A Camphora abſtineat & ſumat quater de die Extracti Hyoſcyami gr. VI.

10. Auguſti magnum lumbricum vivum Ano excrevit; pergit eandem Extracti Hyoſcyami doſin ſumere.

6. Septembris, cum poſt excretum vermem nulli amplius frontis dolores adfuerint, paroxyſmus convulſivus integre emanſerit, & functiones omnes naturaliter proceſſerint, ſanus, viribus pollens dimittitur.

CASUS NONUS.

Textor 20. annorum menſe Septembri anni 1769. ſcabiem, qua a tribus Hebdomadis occupabatur, inuncto aliquoties manibus & brachiis anterioribus unguento quodam retropulit: ſtatim intumuere Crura, quæ ab eo tempore ſemper doluere; & menſe Octobri ulcerata ſunt.

Variis incaſſum uſque ad primam Julii anni 1770. qua Balneis Badenſibus inſidere inchoavit, uſus eſt remediis.

Sub uſu Balnei per 16. dies continuato, crurum tumor, tenſio, dolor valde increverunt, & Ulcera in Gangrænam abierunt, cum qua 17. Julii ad nos curru vectus eſt.

Ulcus magnum ſiniſtrum crus occupans a malleolo externo recta ſurſum ad 15. pollicum Pariſinorum longitudinem extenſum, cujus latitudo ſuperior 3. inferior vero 5. pollicum erat. ſupra caput fibulæ aliud ulcus

Im-

Imperialis magnitudine, & tertium Floreni magnitudinem æquans metatarſo inſidebat: dextri cruris partem externam occupans Ulcus a medio malleolo verſus ſuperiora ad ſex pollicum Pariſinorum longitudinem decurrebat cum latitudine 3. Pollicum & 9. linearum: ſuperiorem externam cruris partem Ulcus pariter imperialis magnitudinis occupabat, vix cum inferiore non coeuns. hæc omnia Ulcera gangræna nigra affecta erant, hinc inde ſaniem fuſcam ſtillantia: Crura tumidiſſima, purpureo, plombeoque colore deturpata, frigida, inferius inſenſilia, ſuperius doloribus plena.

Reſpiratio creberrima, celeris, valde laborioſa, ſæpe ſublimis: Arteriæ membranæ tenues, flaccidæ, videntur tantummodo aerem vehere, & pulſus ſumme irregularis, ſat dilatatus, ita præcipitatus eſt, ut impoſſibile ſit pulſationes numerare.

Caput totum, quaſi a putredine inflatum valde dolet: urens, ſiccus per totum corpus, exceptis cruribus calor: ſupinus diductis cruribus decubitus: lingua nigra, ſicciſſima: ſitis nulla: oculi cœrulei, prominentes, tumidi: tota cutis ſordidiſſima, quaſi pulvere fuſco conſperſa.

Sera veſpera ad noſocomium advecto datur Camphoræ dr. ß. totum Crus omni octava hora medicament. N. 5. deligatur.

18. Julii ſumit quater de die Camphoræ dr. ß. deligatio pergit fieri ut heri.

Veſpere omnia ſenſibiliter in melius mutantur: Gangræna ubique ſeparatur: reſpiratio naturalis: pulſns collapſus, ſolidus, vix febrilis: leniter ſudat: de grato totius corporis refrigerio lætatur. minus tenſa ſunt crura: collapſa eſt facies: oculi vividiores: dolores capitis diſparuere: nox ſequitur fere tota ſomno pacato transacta: Crura ubique calent.

19.

19. mane, fere integra Gangrænoſi in omnibus Ulceribus facta eſt ſeparatio. In fundo magni Ulceris cruris ſiniſtri tendo peronæi ad longitudinem duorum pollicum nudus: in ſuperiori dextri cruris Ulceris tendo bicipitis etiam ſemi pollicem pariter denudatus conſpicitur: facies & oculi naturales, lingua tota humida, marginibus pura: ſitis nulla: crura molleſcunt: color illorum ſenſim ad naturalem accedit. Pulſus liber, dilatatus, cum ſoliditate mollis, 80. pulſationes intra horæ minutum habet. ſudat multum: cutis tactui refrigerata videtur.

Veſpere omnia ulcera ſuppurant: Pus inodorum, optimæ couſiſtentiæ, leniter flaveſcens dant: muſculi ſubjacentes pulchre rubelli: valde detumeſcunt crura; & Æger de magna fame conqueritur.

20. Julii crurum colore naturali præditorum tumor fere integre diſparuit, optima

eſt

eſt ſuppuratio: Æger nocte elapſa optime dormivit.

21. Julii omnia continuant optime procedere: pulſus liber, dilatatus, mollis, 80. pulſationes intra minutum tactui exhibet: tendinum nuditas ſenſim minor fit, nihil in methodo medendi mutatur.

27. Julii tendines carne tecti ſunt: cavitates Ulcerum repletæ: optima ſed multum minuta ſuppuratio: rudimenta Cicatricum in quovis Ulcere conſpiciuntur. Verum Æger, poſt ſolitam Camphoræ doſin aſſumptam ſpeciem levis & cito diſparentis ebrietatis jam a biduo conquerens, hodie vertigine vexatus eſt. Pulſus eſt fortis, plenus, dilatatus, non frequentior ſolito. Jubetur ut tantum Camphoræ dr. I. ß. per diem hancque ſexpartita doſi abſumat. Nox ſequitur bona.

28. Julii Cuſtos vel moniti oblitus, vel bono, quem videbat in Ægro medicamenti

affe-

effectu ſeductus, & non credens nocere poſſe, illi mane adhuc jejuno ſolitam doſin porrexit, unde ſtatim valde vertiginoſus evaſit, & circiter per duo horæ minuta tendinum ſubſultus in omnibus artubus paſſus eſt: datum vero quotidie præfatum Camphoræ pondus, ſed ſexpartita doſi, poſtea tales turbas non amplius excitavit, licet Æger magis nauſeabundus medicamentum ſumpſerit.

29. Æger optime noctu dormivit; pulſus bonus, parum collapſus: circatrices cito augentnr: valde magnus eſt appetitus: conceditur ipſi carnium Eſus.

6. Auguſti Ulcera ſuperiorum crurum & illud quod Metatarſum pedis dextri occupabat, pulcherrima cicatrice obducta ſunt, & duas tertias majorum Ulcerum partes Cicatrix obducit: Æger continuat Camphor. dr. 1. ß. per diem modo ante dicto ſumere, illam bene fert: omnes functiones optimæ.

14. Auguſti ulcus cruris dextri fere integre cicatrizatum: in ſiniſtro tantum ſupereſt pars floreno paulo major cicatrice orba. miſſum facimus Camphoræ internum uſum: externa illius applicatio continuatur.

Sub finem Septembris robuſtus & optime valens, Ulcere nondum perfecte circatrizato nobis invitis ad ſuum opificium redivit.

Menſe Octobri declnante ſub continuatis laboribus & diæta dyſpepta crura pergebant bene habere: quidam tamen ipſi ſuaſit, ut gramen butyro incoctum utrique cruri applicaret: qua methodo per octo dies continuata, dextrum parva, ſiniſtrum majori plaga ulcerari incepit.

Variis poſtea aliis abſque magno ulcerum augmento uſus eſt: donec 16. Januarii anni 1771. febri Petechiali epidemica correptus fuerit: decurrente enim morbo ſenſim gangrænoſa facta Ulcera ſuperficie aucta ſunt; datis autem illi, utpote iterum ad noſtum noſo-

ſocomium delato, 10. morbi die Camphor. rd. 11. per diem ſexpartita doſi, & applicata externe Camphora, gangræna intra quatuor dies ſeparata bonæ ſuppurationi locum fecit. Æger 14. morbi die incepit ſudare & per ſex dies multum ſudavit, ſicque a morbo penitus judicatus eſt.

Poſt hac de Camphora nihil amplius ſumpſit, & ſolo illius externo uſu per 10. vel 12. ſeptimanas continuato, interpoſito ſubinde purgante perfecte curatus eſt: Cuſtodis poſtea officium apud Ægros inivit, manſitque uſque ad menſem Julii anni 1772.

CASUS DECIMUS.

Viginti novem annorum Operarius a 9. menſibus ingentes Oſſis ſacri & vertebrarum lumbarium dolores noctu ſemper intenſiores & ſenſim ita auctos, ut artus inferiores non amplius movere potuerit, patiens

23. Julii ad noſtrum noſocomium delatus eſt.

Nullam præfati doloris cauſam ab ipſo eruere potuimus: hinc materiam Rheumaticam has partes forte obſidere ſuſpicati, cum pulſus liber, mollis, non plenus, 62, pulſationibus intra minutum abſolveretur, & Thermometrum per mediam horam applicatum 97. caloris gradum notaret: Camphoræ dr. 1. per diem quadripartita doſi ipſi exhibuimus.

Sic continuavit uſque ad 15. Auguſti, modo parum melius habere, modo plus pati viſus: vix toto hoc tempore ſudavit: omnes reliquæ functiones manſere bonæ.

16. Auguſti, dolores noctu acerbiſſimi fuere: Thermometrum notat caloris gradum 98. pulſus ſunt circiter 70. intra minutum, magis irritati, molles tamen. Miſſa fit Camphora: dantur ipſi quotidie Mercurii dulcis gr. v. Continuatur deco-

ctum

ctum Chinæ, ſaſſaparillæ Radic. &c. quo jam antea utebatur: interpolatur ſubinde purgans & hac methodo per 22. dies continuata, Æger perfecte abſque ſalivatione curatus eſt, & 13. Septembris Noſocomio valedicit.

CASUS UNDECIMUS.

Feminæ circiter 30. annos natæ 16. ætatis anno menſtrua prima vice erupere: ab eo tempore regularia. Circiter 23. annos nata matrimonium inivit: tres proles debito tempore felici partu in lucem edidit: anno autem 1769. in octavum menſem iterum gravida menſe Auguſto febri acuta continua per 14. dies decubuit: Viſa poſtea ſana.

Sub finem Auguſti Diarrhæa correpta eſt, quæ 20. & ultra dejectionibus Alvinis per plures dies continuatis Ægram valde debili-

tavit: unde præmaturo partu, continuante adhuc Diarrhæa, quartam prolem peperit.

Adhibita medela diarrhæa fere ſubito ſublata eſt, & vix fluxere lochia; pedes ante partum tumidi, ſub diarrhæa collapſi, denuo valde intumuere, & facta eſt aſcitica.

Ex Hungaria ubi tunc degebat, tempore frigido, pluviis nivibusque copioſe alternatim cadentibus, iter pedes Viennam ſuſcepit, ut curaretur, quo appulſa remediis ſumptis ab aſcite & magna crurum œdematis parte liberata fuit.

Menſe Decembri crus dextrum magis intumuit, doluit, tenſum & inflammatum eſt: puſtulæ rubræ illud occuparunt, quas omnes illito unguento quodam retropulit, una magna excepta, quæ inferiorem internam cruris partem obſidebat, & Eſcharam formavit, qua ablata ſubjecta profunde eroſa in conſpectum venerunt.

Hoc

Hoc Ulcus ſenſim omni dimenſione auctum eſt, crure manente tumido, duro, dolente.

Menſe Februario 1770. prima vice ab ultimo partu menſtrua erupere, quæ circa medium Junii iterum pauca fluxerunt, & ab eo tempore non amplius apparuere.

Optimis medicamentis adhibitis, crus mollitum eſt; dolores remiſerunt: quare Ægra menſe Majo lotricem agere cepit, non obſtante Ulceris valde dolentis extenſione & renatis tumore & tenſione dolorifica cruris: hoc munere uſqne ad trigeſimam Julii, qua ad nos delata eſt, continuavit fungi.

Crus duplo majus altero, durum, rubrum, multis locis cœruleſcens, valde dolens: Ulcus profundum Palmæ magnitudine marginibus calloſis, fuſcum, ſaniem paucam, fuſceſcentem fundens, valde dolorificum: Color faciei fuſcoviridis: Pulſus febrilis, par-

vus, flacceſcens : appetitus nullus : lingua ſordida, ſitis mediocris.

Poſt aſſumptam Ipecacuanh. dr. ß. qua aliquoties vomuit Ægra, data eſt illi 1. Auguſti Camphor dr. 1. per diem abſumenda, & Ulceri medicament. N. 5. applicatum eſt.

Secunda Auguſti incepit quotidie Camphoræ dr. 1. ß. abſumere: pulſus adhuc febrilis, minus flaccidus. Ulcus pus tenue, flavum, dat.

3. Veſpere Ulcus pus album, ſpiſſum, blandum dat; margines multum molliuntur.

4. Auguſti crus totum molleſcit, collabitur: ulcus optime ſuppurat: appetitus magnus: ſi is nulla: Alvus & Urina naturales.

Cavitas ulceris renatis carnibus cito impletur: undecima Auguſti crure penitus collapſo, colore naturali prædito ab Ulceris marginibus naturalem mollitiem adeptis, & Ulceris ſuperficiei æqualibus cicatrix circum-

qua-

quaque naſcens conſpicitur: Pulſus plenus, dilatatus, ſolidus, minime febrilis.

14 Auguſti res cum Ulcere optime pergit. Pulſus autem eſt valde plenus, parvus, ſubdurus; vena in brachio dextro ſecta eſt, & eductus eſt ſanguis, qui refrigeratus inſulam compactam, cruſta phlogiſtica tectam, multo ſero innatantem exhibuit.

Poſthac Ægra ſolum dr. I. Camphoræ cum Nitri Scr. II. quotidie abſumpſit. deligata eſt ut ante: penultima Auguſti, ulcere perfecte cicatrizato, ab omni medicamento abſtinuit, & 15. Septembris ſana, bene colorata, robuſta, octiduo ante menſtruis gaviſa ex Noſocomio dimiſſa eſt.

CASUS DUODECIMUS.

Puella 18. annos nata nunquam menſtruata, robuſta, toroſa, jam a ſeptem menſibus male habens prima Auguſti anni.

1770. ad nos delata eſt.

Habebat pulſum valde irritatum, reſi-lientem, tenſum abſque duritie, immo videbatur ſæpe arteria vacua: reſpiratio ſæpe anxia: conquerebatur magnum circa præcordia pondus, & vagos punctorios ventriculi, Hypochondriorum & pectoris, ſubindeque capitis & colli dolores: Abdomen tenſum erat: Appetitus nullus: alvus tarda: Urina varia: Calores vagi ſæpe repetentes, quos ſequebatur copioſus mox brevioris, mox longioris durationis ſudor.

Conſiderantes juvenem robuſtam nondum menſtruatam, dedimus illi Camphor gr. xv. quater de die, viſuri an ſic non erumperent menſtrua, quæ morbum tollerent: vel an alio modo Camphora illam a ſuis ærumnis liberaret.

2. Auguſti omnia paulo mitiora eſſe ait: pulſus eſt minus irritatus, rithmo & tempore

ſæ-

ſæpe varians. Camphoram optime fert & libenter ſumit.

3. Auguſti omnia ut heri. dantur ſexies in die gr. xv. Camphoræ.

4. Auguſti ait ſe noctu bene dormiviſſe: Reſpiratio eſt liberior: pulſus dilatatus, mollis, minus creber: dolores ſunt minores; abdomen minus tenſum: acceſſus caloris & ſudoris rariores, & *Ægra* ſe per totum corpus gratiſſime refrigeratam gaudet. Continuat eadem Camphoræ doſi uti.

7. Auguſti, pulſus pacatiſſimus: omnia naturaliter habent: erupit in manibus & brachiis anterioribus denſo agmine ſcabies: miſſa ſit Camphora, & Puella aliis medicamentis a ſcabie liberata ex Noſocomio abſque evacuatione menſtrua exivit.

CASUS DECIMUS TERTIUS.

Vir 30. annos natus, dum puer eſſet variolas, morbillos & febrim intermittentem feliciter exantalvit, & poſtea ſanus vixit.

Annos 18. natus militiæ nomen dedit: munere ſuo ſanus, alacris per annum functus eſt: dein totum corpus ſcabies purulenta invaſit, quam unguento ex pulvere pyrio & axungia parato ſæpe applicato intra 14. dies percuravit.

Elapſis a retropulſa ſcabie aliquot diebus, concidit quaſi apoplecticus, & poſt binas venæ ſectiones ſibi redditus acute per longum tempus decubuit: donec magnus tumor a ſumma poſterioreque parte Oſſis Ilii uſque ſupra mediam natem dextram ortus eſt, qui apertus circiter menſuram puris dedit: Ulcere cicatrizato alius ſub poplite dextro ortus eſt abſceſſus, qui quoque multum puris dedit,

dit, & 14. dierum ſpatio curatus eſt. Æger poſtea quot annis venam bis ſibi ſecari curavit.

In ultimo bello Boruſſico enſe vulneratum ipſi fuit os perietale dextrum, glande plumbea poples ſiniſter; & poſt, in pugna Torgavienſi tormentorum, quibus inſerviebat aſſiduo fragore factum jam ſurdaſtrum globus ab hoſte miſſus proxime aurem dextram prætervolans ad terram proſtravit: finita pugna ſanguis primo, & dein ſeroſum, quid ex aure effluxit: ſubinde pure mixtus hic fluxus, non obſtante variorum applicatione, per quatuor annos duravit, quo ceſſante per biennium ſibi ſanus viſus eſt Æger.

Menſe Novembri anni 1768. Gingivas lavando oſſiculum tenue, oblongum abſque dolore ex anteriore parte maxillæ ſuperioris ſeparavit: aitque Æger ſe nunquam ibi doluiſſe antea: poſthac autem ſtatim intumuit, & tenſum eſt labium ſuperius, cui Æger ni-

hil admovit, ſolitos labores continuo peragens.

Menſe Majo anni 1770. cum diu pluviæ expoſitus fuiſſet, binis locis ulceratum eſt labium ſuperius: a Medicis, Chyrurgis, Aniculis varia applicata ſunt, ſub quorum uſu malum cito ſerpſit: acceſſit demum pie defunctum Illuſtriſſimum L. B. Gerardum van Swieten, qui illum 10. Octobris 1770. ad noſtrum Noſocomium miſit, & expenſas ſolvit.

Totum labium ſuperius oris, Angulus ſiniſter oris & inde labii inferioris media pars ſiniſtra exeſa, penitus conſumpta erant. ab Angulo Oris ſiniſtro & labiis ulcus profundum late deſcenderat, uſque infra marginem inferiorem partis lateralis ſiniſtræ maxillæ inferioris: dexter oris angulus pariter exeſus, ſed non integre conſumptus: Gena utraque & malarum contigua media pars ad naſum uſque conſumptis cute & panniculo adipoſo

tur-

turpi ſpectaculo ulcerata: labia Ulcerum multis locis dentatis excreſcentiis, involutis, aperturas ſinuum tegentibus, duris, ad faciendas in ſinus, quorum quatuor in ſiniſtra, tres in dextra gena erant, injectiones, præ rigiditate difficulter revolvendis munita ſunt. jam initio hujus anni duo oſſa propria naſi ſponte exciderant, foramenque reliquerant per quod exterius applicata in fauces cadunt: media pinnarum naſi pars exeſa: a ſymphyſi maxillæ ſuperioris margo alveolaris ſiniſter uſque ad tertium molarem carioſus eſt: vix maxillæ amplius cohærentes primus & ſecundus molaris digitis facile educti, carioſi: anterioris hujus lateris dentes jam ante exciderant. omnia hæc Ulcera ſive potius ex his invicem communicantibus conflatum ulcus totum ſordidum, fuſcum, fœtidiſſimum, ſanie fuſca diffluit. Pulſus eſt flaccidus, debilis, parvus, febrilis: Reſpiratio bona: maſticatio ciborum impoſſibilis:

lis: hinc tenuia alimenta cochleatim ipſi ingeri debent: ſitis mediocris: alvus naturalis.

Deligantur ter de die omnia Mucilag. N. 5.

Datur ipſi omni tertia hora Camphor dr. ß. ut 24. horarum ſpatio illius dr. III. abſumat.

11. Octobris omnia depurantur; fœtor minuitur. dictam Camphoræ doſin libenter ſumit, & abſque minimo incommodo fert.

12. ubique pus tenue flaveſcens adeſt: fœtor diſparuit.

13. bonum pus dant omnia Ulcera, rigidi molliuntur margines & ſuppurant.

20. Octobris Ulcus, quod ab angulo Oris ſiniſtro deorſum verſus mentum & lateralem ſiniſtram maxillæ inferioris partem omnia exederat, carnibus impletum fere integre cicatrizatum: Cava ubique implentur, in facie & in multis locis cicatricum rudimenta

con-

conſpiciuntur. ſinus hinc inde ſub integu. mentis latentes vix amplius ſenſibiles, & dentatæ Labiorum Ulceris excreſcentiæ fere integre bona ſuppuratione conſumptæ. Præfatam medicamenti doſin optime fert, & pergit libenter ſumere: bene dormit, facilius deglutit, & magnum appetitum habet: omnes reliquæ functiones etiam bonæ.

25. Octobris dextrum os ſpongioſum naſi fruſtillatim emunxit: omnia cito in melius pergunt.

1. Novembris cicatrizatis oris angulis & illorum vicinia, ulcereque anteriorem maxillæ ſuperioris partem occupante firma cicatrice obducto, ſeparataque inſenſibiliter carie partis ſiniſtræ maxillæ ſuperioris, quæ nunc hoc loco ſpecie membranæ veſtita eſt, panem cito & facile maſticat: de ingenti appetitu conqueritur; hinc præter alia alimenta conceditur ipſi carnium Eſus. Pulſus manet pacatiſſimus, mollis, liberrimus: infe-

rior

rior Naſi pars etiam cicatrizata eſt: foramen Naſi ſuperioris partem occupans clauſum eſt: & hoc Ulcus incipit cicatrizari.

Licet Æger de Camphora nihil conqueratur, & optime illam ferat, cum videatur ſufficere nunc doſis minor, præſcribitur illi Formula N. 4. & deligatio tantum bis in die inſtituitur.

Sic continuavimus uſque ad 23. menſis Decembris, qua die ego & plures Medici mecum Noſocomium frequentantes omnia cicatrizata invenimus: ſuperior autem malæ ſiniſtræ pars eſt œdematoſa, coloris cœrulei, minime tamen etiam ab attactu rudiori dolens.

Pulſus eſt pacatus, ſed valde plenus, ſolidus: Capitis gravitatem præcipue veſpere conqueritur: cœterum optime habet; robuſtus eſt: ſolitus eſt autumnali tempore venæ ſectionem inſtituere, quæ hoc anno negle-

cta

ĉta fuit: quare vena ſecta eſt, & eductus eſt, ſanguis omni nota bonus.

24. Decembris ab omni medicamento quieſcit, & 25. ſumit purgans.

Poſt hæc alacriter continuavit habere, & quotidie Camphoræ dr. 1. abſumpſit.

18. Januarii 1771. color lividus malæ diſparuit: œdema diſſipatum eſt. Miſſa fit Camphora: datur ipſi Decoctum lignorum cum antimonio crudo, ut eo magis depuretur humorum maſſa, ſtatuimuaque in horum uſu per ſex ſeptimanas continuandum: verum inſalutato hoſpite initio Februarii diſceſſit.

1. Septembris 1771. denuo ad nos redivit: ſuperiore Naſi parte late ita exeſa, ut ipſe canthus internus oculi ſiniſtri penitus conſumptus eſſet, oculo toto & utraque palpebra valde inflammatis.

Ab Angulo oris dextro Ulcus ad labium anterius oſſis maxillæ inferioris deſcendens,

ſi-

ſiniſtrorſum ſupra menthum uſque ad partem lateralem ſiniſtram maxillæ extenſum ita profunde omnia exederat; ut reſidua labii inferioris pars continuo videretur exciſura: genæ hinc inde levioribus Ulceribus occupatæ erant. Pulſus ut prima vice erat mollis, flaccidus, parvus, debilis: reliquæ functiones utcumque bonæ.

Eodem Medicamento ac ante deligata ſunt omnia, & juſſi, ut de Camphora ipſi daret aſſiſtens meus, quantum abſque incommodo ferre poſſet: metuebam enim jacturam oculi & labii inferioris ac alia teterrima mala, ſi ſerpentibus Ulceribus non ſtatim ponerentur limites.

Data eſt ipſi omni bihorio Camphor. dr. ß. donec ea die unc. ß. abſumpſerit: noctu bene dormivit.

2. Septembris inflammatio oculi & palpebrarum minor: non ſerpunt ulcera: datur

ea-

eadem medicamenti doſis ac heri, quam avide ſumit.

3. Septembris Ulcera multo pure bono tecta ſunt: hodie iterum Camphoræ unc. ß. abſumit; pulſus eſt minus flaccidus, pacatiſſimus, minime irritatus, qualem 4. Septembris cum pie defuncto Illuſtriſſimo L. B. Gerardo van Swieten plures doctiſſimi Medici & Chyrurgi invenerunt: erat ubique magna & optima ſuppuratio: labium inferius, carnibus in cavitate ulceris menthi jam incipientibus recreſcere, minus vacillabat, quare Camphoræ tantum dr. III. impoſterum Ægro quotidie datæ ſunt, qui ultra unc. ß. per diem ſumpſiſſet, ſi ipſi porrecta fuiſſet major doſis.

Quatuor primis diebus quater quinquies in die alvum copioſam dejecit: quæ dein facta eſt naturalis. 8. Septembris inflammatio oculi & palpebrarum diſparuerat.

Elapſis a ſuo in Noſocomium reditu, binis menſibus ulcera carne impleta denuo cicatrice, exceptis tribus purvis plagis, lentis magnitudine genam ſiniſtram occupantibus, obducta erant.

Æger dr. 111. Camphoræ quotidie uſque ad 16. Novembris abſumpſit, qua demum ab illa iterum abſtinuit. Pulſus erat tunc plenus, ſolidus, dilatatus; naturales omnes functiones: ob conſuetudinem vena ſecta ſanguis optimus eductus eſt, & ab omni medicamento uſque ad initium Decembris abſtinuit: dein ſanguinem depurantibus medicamentis denuo incepimus uti, continuaturi diu.

Sub finem Decembris fit moroſus homo, quod tam diu in noſocomio detineatur; & initio Januarii 1772. me inſcio diſceſſit, egregie quidem valens, ſed binis parvis lenticularibus plagis genam ſiniſtram occupantibus nondum integre cicatrizatis.

CA-

CASUS DECIMUSQUARTUS.

Fœmina 60 annorum valde toroſa menſtruis, quæ prima vice illi 13. annos natæ eruperant, & quamdiu durarunt ſat regularia ſemper fluxere, jam a 20. annis orba, poſt exantlatam circa vigeſimum ætatis annum febrim putridam exanthematicam crure dextro incepit per intervalla dolere, quod brevi mole parum auctum eſt, & varicibus, veſiculisque aqua plenis, ſæpe renaſcentibus affectum.

Emanentibus menſtruis, demum in parte interna paulo ſupra malleolum exulceratum eſt crus, cum quo per 20. annos vitam doloribus & incommodis plenam duxit.

Anno 1769. crus incepit mole valde augeri, & ulcus in omnem dimenſionem extendi, quibus ſenſim incrementum capientibus, fœmina præ doloribus & pondere cruris ad

omnem motum inepta reddita ad noſtrum Noſocomium circa medium Octobrem anni 1770. delata eſt.

Crus erat duriſſimum, lividum, monſtroſæ mollis: Femur minus durum, Coloris naturalis multum quoque tumebat. Ulcus inferiorem internam cruris partem occupans cavo ſuo magnum pugnum virilem capere facile potuiſſet, totum fuſcum, ſaniem fœtidam fundens, valde dolorificum, marginibus calloſis, crenatis. Cœterum ſat bene habebat fœmina.

Ægræ levamen adferendi, & quid in tam antiquo & difficili morbo poſſit Camphora, experiendi cupidus, ejusdem dr. 1. per diem abſumendam, exhibito prius purgante, fœminæ pulſum mollem, parvum, debilem habenti præſcripſi, juſſique ut ulcus ſaturata mucilagine Camphorata deligetur: tribus diebus elapſis, totum ulcus optime ſuppurabat, ſublatis integre doloribus. præſcribitur

illi

illi Formula N. 3. id eſt Camphoræ dr. I. ß. per diem.

Hac methodo ad 13. Decembris continuata, crus multum mollitum eſt: cavitas ulceris ultra mediam partem renatis carnibus impleta, marginibus mollitis æqualibus.

Ob tarditatem alvi & abdominis tenſionem datur purgans quod vix operatur.

14. Decembris abſtinet a Camphora & datur ipſi ſequens Enema.

℞. Gumm Arab. unc. I.
Solve in Aq. pur. lib. I.
Dein terendo admiſce.
Camphor unc. ß.
Tepide quotidie injiciatur.

Prima die ſemel: 2. ter: 3. quinquies poſt Enema, quod plerumque ultra bihorium abſque minimo incommodo retinet, valde copioſas fœces excrevit: ut tamen adhuc diutius retineatur, poſtea Laudani puri gr. I. ſemper additur.

Hoc modo Enemata adhuc per 9. dies continuata ſunt: quo tempore Ægra abſque virium jactura, quater, quinquies, ſubinde etiam ſepties alvum copioſam magno cum abdominis & cruris fere nunc ad volumen naturale redacti, collapſu exoneravit. appetitu valde aucto: pulſu ſolido, molli, minus debili, magis dilatato & reliquis functionibus bonis.

Sub horum Enematum uſu, nec minimum incommodum paſſa eſt Ægra.

26. Decembris denuo incipit Camphoræ dr. I. ß. ſumere, & ulcus ſolito modo continuat deligari.

28. Januarii anni 1771. ſuperficies ulceris marginibus æqualis eſt: hincinde Cicatricis rudimenta conſpiciuntur: nullus amplius in carnibus & integumentis tumor: Oſſa vero ſunt paulo craſſiora, quam in ſiniſtro crure.

Continuatur Camphoræ uſus: interpolato ſubinde purgante.

Ini-

Initio Martii totum latum ulcus excepta parte centrali Floreni magnitudine cicatrice obductum eſt. Hucuſque ſumpta Camphor dr. 1 ß. Ægræ nec minimum incommodum cauſavit: illam autem nunc nauſeat: illius uſui interno ſuperſedetur, & ſuperiori Cruri inciſione facta, forticulus paratur.

Adhuc parum minuta eſt ulceris ſuperficies, quod, licet eodem modo ac ante deligatum, integre cicatrice non fuit abductum. Ex Noſocomio ſub finem Maji anni 1771. hæc fœmina ſaniſſima dimiſſa eſt.

CASUS DECIMUSQUINTUS.

Vinitor 27. annos natus, toroſus, robuſtus 29. Novembris aſſeres navis fractæ ex loco aquis inundato exportaturus in aquam deſcendit; in clavum pede ſiniſtro impingit, qui inter oſſa metatarſi digiti minimi & vicini pedem perforat, alte in dorſo pedis

extans: domum pedes abſque dolore redit: nihil applicat: ſequenti demum die pes incipit intumeſcere, dolere. Auctus ſenſim tumor & dolor totum crus occupat.

4. Decembris omnia ſunt livida, frigida, ſenſu privata: Advocatus Balneator credit omnia perdita: nihil applicat.

5. Decembris ad noſtrum Noſocomium curru vectus advenit.

Crus totum & pes, ut prius jam dictum, valde tumida, plumbea, frigida, inſenſilia, excepta parte popliti vicina ſenſu adhuc prædita: valde debilis eſt Æger, reſpiratio lenta, tarda, laborioſa: Pulſus debilis, parvus, flaccidus, creberrimus, inæqualis, irregularis: oculi luridi: cutis faciei collapſæ, triſtis, ut & reliqui corporis, ſordida, quaſi pulvere fuſco conſperſa.

Digitus minimus jam totus putrefactus cultro a pede ſeparatur: pes ſcarificatur & Mucilag. N. 5. ſicut totum crus omni triho-

rio

rio tepide deligatur: datur ipſi omni 4. hora Camphor. Scr. I. ſumendus.

6. Decembris reſpiratio paulo minus laborioſa videtur, & pulſus minus flaccidus: cœterum nulla mutatio.

7. Crus multum detumuit: livor illius minutus eſt, tepeſcit: ſenſus adhuc abeſt.

Pes multum collapſus, lividus adhuc eſt, caloris & ſenſus expers: partes ſcarificatæ humectantur: ſaniem fundunt: reſpiratio adhuc melior quam heri: pulſus ſolideſcit: minus debilis eſt. Dantur omni 4. hora Camphoræ. gr. xxv.

8. Nulla mutatio: ob alvum a triduo ſtipatam datur Enema oleoſum quod multas fœces ſolidas educit.

9. Decembris aliquis ſenſus in crus & pedem redit: ſenſim magis collabuntur: omnia calent: livor diſparuit: loca ſcarificata magis humida: cutis ſordities diſparet: vires eriguntur: nullum a Camphora incom-

modum: hinc illius dr. ß. omni 4. hora ſumat.

10. Crus coloris fere naturalis, fere integre collapſum eſt: calet: valde dolet: pes quoque calidus, valde dolorificus eſt: ſaniem mucilaginoſam fundit: pulſus eſt ſolidus, ſat fortis, plenus, minus frequens: reſpiratio libera.

11. Decembris loca pedis ſcarificata parum puris diluti dant: reliqua, ut heri: Æger tamen melius dormit, & alvum ſponte quotidie deponit.

12. ſuppuratio major fit in pede: dolores in crure ceſſarunt.

13. Pes valde ſuppurat: adhuc multum dolet: pus eſt dilutum, cinereum. deligetur poſtea eodem medicamento tantum bis de die; & cruri optime habenti nihil amplius applicetur.

14. magna eſt ſuppuratio: pus paulo melius.

15. pus copioſum, album, ſpiſſum in locis ſcarificatis adeſt: vix amplius dolet pes: Camphoræ magnam hanc doſin optime fert.

16. Decembris noctu optime dormivit: ſuppuratio ut heri: dolor vix ullus: appetitus magnus: pulſus omni nota bonus: reliquæ functiones omnes optime procedentes: media Oſſis Metarſi digito minimo reſpondentis pars carioſa eſt.

20. Decembris omnia optime procedunt: famem conqueritur Æger: conceditur ipſi carnium facilis digeſtionis eſus, & continuat Camphor dr. III. quotidie abſumere.

29. Decembris, quæ carioſa erat Oſſis metatarſi pars, hodie ſponte ſeparata eſt, Ulcus dorſi pedis, ſeparatis vel conſumptis omnibus heterogeneis, purum eſt, & circumquaque incipit cicatrizari: omnes functiones bonæ ſunt: vires creſcunt. Æger pergit Nychtemeri ſpatio Camphoræ dr. III. abſumere.

18.

18. Januarii anni 1771. hucuſque continuavit Æger Camphor dr. III. ſumere: illam nunc nauſeat: duæ tertiæ ulceris partes cicatrizatæ ſunt: uſui interno Camphoræ ſuperſedetur, & continuatur externa illius applicatio.

14. Februarii febri petechiali Epidemica tunc temporis valde graſſante corripitur: tertia morbi die jam eruperant petechiæ rubræ fuſcis intermixtis: 6. morbi die ſuppuratio in ulcere minus bona: Ulcus dilatatur: loco aliorum medicamentorum, quibus in hoc morbo hucuſque uſus eſt, datur ipſi quotidie Camphoræ dr. I. & Ulcus pulvere Camphoræ ſuperpoſitis deſuper plumaceolis ſiccis totum denſe tegitur: ſicque jam ſequenti die ſuppuratio melior erat, nec amplius poſtea aucta eſt ulceris ſuperficies.

10. morbi die vix non omnes diſparuerant Petechiæ, & Æger inde valde anxius & debilis factus eſt.

11. morbi die ſubito omnia ſymptomata diſparuere: Æger videtur curatus: verum ecce apparet macula in externo inferiori labii inferioris parte ad radices dentium inciſoriorum faba majori amplior, livida, in os uſque penetrans, quæ cito aucta mariani magnitudinem eadem adhuc die æquavit, & pars marginis alveolaris cum dentibus mentho reſpondens ad 9. circiter linearum longitudinem nigra eſt, dum interea Æger bene habens de exantlato morbo valde gaudet.

Deligantur omnia Mucilag. N. 5. & dantur Ægro Camphor dr. 11. per diem ſexpartita doſi ſumendæ.

Sic tridui ſpatio illa gangræna penitus ſeparata eſt: carnes deperditæ ſenſim reparatæ fuerunt: 8. Martii Ulcus cicatrice jam incipiebat obduci, & ante finem Martii penitus cicatrizatum eſt: pes quoque perfecta cicatrice obductus eſt: Æger a medicamentis abſtinet.

Cir-

Circa medium Aprilis nobis invitis, vacillante jam oſſis parte corrupta, ex noſocomio diſceſſit, laboribus ſuis ruſticis operam daturus.

CASUS DECIMUS SEXTUS.

Fœmina 40. annos nata, menſtrua ſemper pauca & irregularia habuit: a juventute colore cachectico deturpata, ſcorbutica, frequentibus artuum doloribus obnoxia, crus dextrum a duodecim annis ulceratum habens, laboribus domeſticis utcumque ſemper ſuffecit: donec 3. Decembris per plateas incedens currus raptim prætervecti Rota in crus ulceratum impingente in terram violenter præcipitata fuerit: unde ſtatim ingentes dolores urentes, lancinantes totum crus & femur occuparunt.

Acceſſerunt frequentes horripilationes, calores, ſitis: & deletus eſt appetitus. Crus ci-

cito intumuit, rubuit: 6. Decembris lividum factum eſt, & Ulcus incepit ſicceſcere, nigrum fieri.

10. Decembris anni 1770. illam curandam ſuſcepi. Ulcus quatuor digitos transverſos latum, totum crus paulo ſuperius malleolis cingebat, gangræna nigra circumquaque occupatum hinc inde paucam ſaniem fuſcam fundens. Crus valde tumidum, lividum, frigidum, paulo fortius preſſum multum dolebat: faciei ſordida cutis; oculi luridi, humidi: reſpiratio crebra, fræquenter inæqualis. pulſus creberrimus, flaccidus: lingua humida, liveſceſcens: ſitis multa: ſudor frequens, copioſus. Totum crus & ulcus mucilagine N. 5. deligatur, & Ægra quadripartita doſi Camphor dr. 1. quotidie incipit abſumere.

11. Decembris crus valde dolet, collabitur, minus lividum eſt, calet: Gangræna ſe-

pa-

paratur: functiones vitales videntur in melius mutari.

12. Decembris gangræna integre ſeparata ulcus purum eſt: dolores cruris valde leniti: ſitis vix ulla; facies & oculi meliores: reſpiratio optima: pulſus ſolidus, dilatatus, ſat fortis, Apyretos. noctu fere per tres horas ſat pacate dormivit: Alvus cocta mane ſponte ſeceſſit: ſudor multum minutus.

13. Decembris totum Ulcus optimum pus dat, crus coloris naturalis fere integre collapſum: reliqua ut heri.

16. Decembris, omnia optime pergunt: appetitui renato major ciborum copia conceditur.

20. Decembris Ulceris optime ſuppurantis ſuperficies marginibus æqualis eſt; jam adſunt cicatricis rudimenta. Continuat Camphor. dr. 1. quotidie ſumere: & jam a quatuor diebus tantum bis de die, eodem ac

an-

ante, medicamento deligatur: ſudor nullus: omnes functiones bonæ.

18. Januarii, tota poſterior & lateralis ulceris pars bona cicatrice obducta eſt: & anterius magnos progreſſus facit cicatrizatio: Ægra optime habens a Camphoræ, quam optime tulit, uſu interno abſtinet: deligatio continuatur, ut ante.

10. Martii omnia cicatrizata, excepta plaga medii floreni magnitudine, cicatrix jam ab initio hujus menſis non pergit ulterius: quare hoc parvum Ulcus remaneat, mundetur diligenter, & Ægra diæta vegetabili, quantum fieri poteſt, utatur.

CASUS DECIMUS SEPTIMUS.

Puella ruſtica 26. annos nata, ſanguinei temperamenti, toroſa, robuſta, poſt exantlatum in Infantia morbum varioloſum & morbilloſum ſemper ſana, menſtruis de-

bite ſemper gaviſa, ante quatuor annos febri putrida, qua multi in ſuo & vicinis pagis mortui ſunt, correpta eſt.

Finito morbo intumuit pes dexter circa malleolos uſque ad ſuram abſque dolore. hic tumor permanſit: menſtrua denuo debitam periodum ſervarunt, & Ægra ſana vixit, laboribus egregie exercitata.

Menſe Auguſto anni elapſi in paludoſum locum, aqua ſtagnante plenum, deſcendit gramen procerum ibi creſcens collectura: In palude ſtanti viſus eſt ſibi momorſus fuiſſe circa malleolum internum pes dexter, qui ab eo tempore incepit dolere & ſenſim cum parte inferiore cruris mole magis auctus brevi infra malleolum exulceratus eſt.

Malum ad omnia applicata ſemper fuit exacerbatum, quare ſub finem Septembris anni 1770. egregium Chyrurgum in ipſius Vicinia degentem advocavit puellæ Herus, qui per tres menſes optima medicamenta ſol-

ven-

ventia, antiſeptica & ipſum corticem peruvianum in & externe applicuit: ſub quorum uſu Ulcus fœtidiſſimum evaſit, & omnia continuarunt in pejus ruere: quare de cura Puellæ deſperans, illam curru ad noſtrum Noſocomium 17. Decembris anni 1770. advexit, & totam morbi hiſtoriam nobis enarravit.

A media ſura uſque ad plantam pedis omnia tumore fuſceſcente, magno, dolente, elaſtico, circumquaque diſtenta ſunt: internam cruris partem ulcus, cujus centrum ſupra malleolum eſt, occupat cancroſum, in fungum ſolidum, nigreſcentem, alte elevatum: margines calloſi, retorridi ſunt, & totum Ulceris ambitum phlyctenæ magnæ, nigræ, ſanie atra plenæ occupant.

Reſpiratio valde inæqualis, irregularis, celeris, crebra, ſublimis, modo etiam profundior, anxia ſemper: dextra carpi arteria tenuiſſima, quaſi membrana conſtans, flac-

cidiſſima videtur aerem tantum vehere. Pulſus ſubinde tenſus, creberrimus, celerrimus: ut intra horæ minutum 130. pulſationes numeraverim, nec omnes numerando aſſequi potuerim: in ſiniſtro brachio arteria plenior aliquam ſoliditatem abſque tenſione ſervat: ſitis multa: lingua ſordibus cinereis obſita: facies fuligine conſperſa: oculi luridi, triſtes: decubitus ſupinus; ſudores copioſi, tenues, fere continui.

Quinta veſpertina incipit omni quadrihorio Camphoræ Scr. 1. ſumere: & omnia Mucilag. N. 5. deligantur: apparatu omni tertia quartave hora renovando. nox ſequitur inquieta.

18. Decembris, Ulcus minus fœtet: reſpiratio videtur paulo melior: Camphoram bene fert. circa meridiem incipit illius dr. ß. omni quarta hora ſumere.

19. Reſpiratio tantum majori frequentia peccat. Pulſus ſolideſcit, minus præcipi-

ta-

tatus eſt: Ulcus multum ſaniei fundit: nigredo nulla. dolor in ulcere & crure magnus.

20. Decembris Ulcus totum, excepta media parte fungi, pus dilutum, flavum dat: fœtor omnis diſparuit: in parte poſteriori ulceris prope marginem ſeparatis gangrænoſis ſubjacentibus profundum cavum, ovum calumbinum facile capere potens, in quo tendo denudatus oculis patet, factum eſt: prope marginem inferiorem verſus tibiam fungus ſpeciem cartilaginis mobilis duarum fabarum baſibus ſuis connexarum magnitudine includere videtur: labia ulceris molliuntur: minus retorrida fiunt. Nox fuit pacatior. facies & oculi naturales. lingua pura: ſitis nulla: vires eriguntur: reſpiratio eſt fere naturalis: pulſus eſt ſolidus, mollis, plenus, liber, & 94. pulſationibus horæ minutum abſolvit: Urina bona: Alvus naturalis & appetitus redit: cutis mollis, perſpirans: ſudor rarus & paucus.

21. Decembris omnia bene pergunt, pulſus 83. pulſationes intra horæ minutum habet.

22. Decembris poſterior labii Ulceris huc uſque retorridi, exterius fungoſi, intus duriſſimi pars ſuppuratione multa incipit conſumi, ſuppurat quoque tota fungoſa Ulceris excreſcentia. Pulſus dilatatus, regularis, ſolidus, 80. puſationes intra horæ minutum habet: reſpiratio optima: cutis mollis: ſudor nullus: veſpere poſt aſſumptum medicamentum Capitis gravitatem & vertiginem conqueritur: hinc tantum Camphoræ Scr. I. omni quarta hora datur.

25. Decembris, omni nocte ſat bene per plures horas dormit: crus & pes detumuerunt, colore naturali prædita ſunt: Labium poſterius ulceris ſuppuratione penitus conſumptum eſt: circumcirca ſuppuratio bona eſt, quæ ſupra fungoſam excreſcentiam diſparuit: ſub illa autem ſerpens ſuppuratio

par-

partem unam fungoſitatis poſt alteram forma membranularum flaccidarum ſeparat: cartilago antedicta in fragmentula cylindrica tangentem digitum pungentia, flexilia, acicularum figura, N. 12. vel 13. diſſiliit.

Ægra pergit quoad omnia ſemper melius habere.

28. Decembris, foramen antea dictum prope labium poſterius Ulceris ſuperficiei renatis carnibus æquale eſt: ſed ſeparato fungoſo aliud hodie in parte anteriori inferiori Ulceris, quod nucem juglandem capere poſſet, adeſt, ubique ſuppurans: huic foramini ſuperius adjacent duo tubera mediam nucem juglandem æquantia, unum album, molle: aliud carneæ ſoliditatis rubellum: fungoſitas ulceris ſuperficiem tegens continuat ſuppuratione, ſubtus ſerpente lamellatim ſeparari: Labia antea retorrida fere in toto Ulceris ambitu conſumpta.

2. Januarii Labiis Ulceris penitus conſumptis cicatrix naſcens circumquaque conſpicitur: fungoſitas ulceris integre ſeparata eſt: tota Ulceris ſuperficies pus ſat ſpiſſum, ſed flaveſcens dat. Ægra poſt aſſumptam Camphoram angitur; vertiginoſa fit. Pulſum habet hominis plethorici, bene habentis: omnes functiones ſunt ſanæ: abſtinet a Camphoræ interno uſu, quæ externe ut ante continuat applicari.

10. Januarii, cicatrix circum Ulcus nata jam ad tres lineas verſus ulceris centrum ſe extendit: media ulceris pars excreſcit: omnes functiones bonæ, datur quotidie Enema N. 6.

Continuat Enemate uti uſque ad 19. Januarii: Alvus deponitur quotidie ter, quater, non obſtante addito laudani puri. gr. I. Ulcus in medio continuat parum excreſcere, & cicatrix non augetur. quoad reliqua ſaniſſima eſt Ægra. miſſum fit Enema.

Ap-

Applicatur veſpere Ulceri pulveris Camphoræ denſum ſtratum & plumaceolis ſiccis tegitur: jubetque Dominus Wallner ut aliquis ex ſuis Ægræ adſtet, qui illum moneat, ſi Ægra vel nimio dolore vel aliquo alio malo ſymptomate corripiatur, ut ſtatim omnia auferantur: verum Ægra, nunquam doloris a multo tempore expers, per mediam horam grati caloris ſenſum paſſa, placide obdormivit: ſomnusque ultra novem horas protractus eſt. ſequenti die optima in Ulcere, & multo copioſior ſolito aderat ſuppuratio. ſic quotidie ſemel deligatur Ægra. Cavitas antedicta ſenſim impletur: tubercula conſumuntur: cicatrix, pergente magna ſuppuratione, cito augetur & 15. Februarii Ulcus perfecte cicatrizatum eſt. initio Martii menſtrua debita quantitate denuo fluxere & Puella ſaniſſima paulo poſt diſceſſit.

CASUS DECIMUS OCTAVUS.

Puellæ 22. annorum 15. ætatis anno prima vice menſtrua erupere, quæ ſemper irregularia fluxerunt.

19. ætatis annum agens, acuta febri correpta diu decubuit: ac anno 1769. circa medium Maji febri intermittente irregulari, modo quotidiana, modo tertiana, incepit laborare, quæ ſub finem Julii ſponte ceſſavit, & ab eo tempore puella minus bene habuit.

Menſe Majo hujus anni febris tertiana regularis illam invaſit: cujus pertæſa poſt tertium paroxyſmum Piper pulveriſatum vino dilutum hauſit: ab hoc pulvere violenter & ſæpe vomuit, & emanſit febris: ſed ab eo tempore omni ſeptimana bis, terve parvas narium hæmorrhogias paſſa eſt.

13. Decembris in tumore ovum gallinaceum æquante, cujus originis tempus ignorat

rat Ægra, & circa arcum 4. & 5. Coſtæ veræ poſtrorſum ſitus eſt, incepit tenſionem & dolorem leniter pungentem pati: dolor hic cito valde augetur. 15. Decembris poſt meridiem acceſſit magnum frigus cum valido tremore, quæ per quatuor horas durarunt, & locum fecerunt calori urenti, qui circa matutinum tempus lenior evaſit.

16. Decembris ad nos defertur: febris eſt ſat magna, reſpiratio frequens, celeris: totum pectoris latus ſiniſtrum tenſum, rubrum, dolens: Tumor arcum coſtarum occupans in apicem elevatur, mollitur. Dantur decocta demulcentia & toto ſiniſtro lateri applicatur cataplaſma emolliens: ſic 17. & 18. continuatur.

19. manifeſta in tumore toto molli adeſt fluctuatio: tenſio & rubor circumjacentium integumentorum diſparuit: reſpiratio melior: febris ut ante. aperitur tumor: effluit ingens copia puris viridis, tenuis, fœti-

di,

di, quod a ſterno ad cavum ſubaxillare & circa mammam fere uſque ad claviculam ſub integumentis ingentem ſinum fecit. Datur Cortex Peruvianus: fiunt injectiones ex Decocto corticis peruviani, aliis antiſepticis & depurantibus uſque ad 27. Decembris: Inde nihil in melius mutatur: materies effluens æque mala ac ante: febris eadem: pulſus eſt mollis cum aliqua tenſione, videturque ſubinde fere vacuus.

27. Decembris miſſa fiunt priora medicamenta: Dantur Ægræ quater in die Camphor gr. xv. in ſinum injicitur mucilago N. 5. & integumenta linteis eadem mucilagine impprægnatis teguntur. id bis in die repetitur.

Ab uſu Camphoræ jam prima die dolores valde leniti, & 29. Decembris ex Ulcere & ſinibus pus ſpiſſum, album, inodorum exit.

5. Januarii 1771. appetitus viget: ſitis nulla: pulſus & reſpiratio ſat natnrales: dolor

lor nullus, niſi ſub deligatione: ſomnus melior, quam ante: reliquæ functiones bonæ.

7. Januarii circumquaque minuitur ſinus, & pergit optimum pus dare.

18. Januarii de ſinu nihil ſupereſt: Ulcus coaleſcit: color cutis melior, vividior: continuat eandem, ac ante, Camphoræ doſin ſumere.

28. Januarii ulcus coaluit: puella quoad omnia ſana eſt, & paulo poſt ad ſolitos labores redit.

CASUS DECIMUS NONUS.

Illuſtris & antiquiſſimæ Proſagiæ vir quadraginta aliquot annos natus, a 21. annis militiæ operam dans, morbis Venereis ſæpe affectus, Mercurio varie applicato ſemper, ſaltem apparenter curatus, ſub finem Januarii anni 1771. curat me vocari.

Re-

Refert ſibi ante ſeſqui annum in ſuperiori dextra Naſi parte ſponte erupiſſe puſtulam, quæ ſcalpendo irritata ſtatim incepit in fungum excreſcere.

Advocatus Chyrurgus excitata per frictiones mercuriales ſalivatione & lapidis infernalis applicatione malum auferre conatus eſt: verum inde irritatum citius excrevit, nulli medicamento cedens: quare 14. Julii anni 1770. a doctiſſimo & expertiſſimo Chyrurgo amputatus eſt tumor: Ulcus autem nullis medicamentis potuit ad cicatricem duci, & incepit denuo excreſcere, incaſſumque fuere omnia, quæ poſtea applicuit.

Dum illum in curam ſuſcepi, pedunculo brevi, cujus circumferentia duodecim lineas æquabat, maſſa cancroſa, fuſca, undequaque ulcerata ſaniem acrem fundens nucis juglandis magnitudine inſidebat; integumenta adjacentia ad trium quatuorve linearum latitudinem eroſa erant. Cœterum Æger, to-

ro-

roſus, viribus optimis gaudebat. pulſus ſat plenus, fortis, liber, minime febrilis.

Camphoram quacumque forma datam doſi etiam valde remiſſa non tulit: ajebat ſibi poſt quamlibet doſin caput tendi, rigidum & vertiginoſum fieri: hinc ſola externa Mucilag. N. 5. applicatione curam tentare coacti fuimus.

Tertia die ab applicatione medicamenti, optima ubique ſuppuratio aderat, quæ abſque interruptione continuavit.

26. Februarii, Ulcus integumentorum circum excreſcentiam cancroſam coaluerat: hæc autem licet continuo ſuppurans lente minuebatur: quare vocatus expertiſſimus Wallner, Noſocomii noſtri Chyrurgus ordinarius, cum Domino Liegle ordinario Ægri Chyrurgo Ægrum inviſit. craſſis linteis carptis convulutis ſpeciem chordæ laxæ fecit, qua mucilagine camphorata imprægnata latum pendunculum ligavit: chorda hæc quoti-

die

die mucilagine camphorata humectata ſenſim quotidie magis conſtricta eſt: Pedunculus & inferior fungi pars multum copioſa ſuppuratione conſumpta ſunt, & 16. Martii tota maſſa excidit ſuperius gangrænoſa facta, & Ulcus reliquit Mariano majus, cui quotidie ſemel denſus inſpergitur Camphoræ pulvis, ſuperpoſito deſuper plumaceolo ſicco.

Hac methodo ante finem Aprilis perfecta & firma cicatrice obductum eſt Ulcus; & hucuſque manet curatum.

CASUS VIGESIMUS.

23. Annorum juvenis 24. Februarii anni 1771. ad nos delatus eſt.

Quantum ex ipſius narratione colligere potui, 12. erat febris petechialis epidemicæ dies, quam in itinere ex Auſtria ſuperiori Viennam verſus contraxerat: totum pedem dextrum circa nonum morbi diem livor, inſenſilitas ſubito occupaverant:

rant: omnes pedis digiti gangræna nigra, ſicca affecti erant & tantum ſupra malleolos calor & ſenſus aderant. totum corpus petechiis nigris obſitum erat: arteria flaccida, fere vacua, lente & cum debilitate digitum feriebat: reſpiratio videbatur naturalis.

Datur ipſi omni bihorio diei Camphor. Scr. 1. ut quotidie dr. II. abſumat, & totus pes mucilag. N. 5. diligenter fovetur.

25. Februarii color pedis minus lividus: pulſus minus flaccidus.

26. dolores in dorſo pedis conqueritur: digiti hinc inde ſaniem fundunt: Pulſus ſenſim melioratur: multæ petechiæ colorem rubrum induunt: faciei & oculorum color nitidior: Alvus & Urina naturales.

27. omnes digiti multa ſanie hinc inde Pure mixta diffluunt: ultimæ phalanges digiti minimi, vicini & pollicis nigræ: totus pes dolet, calet, coloris naturalis eſt: pulſus

ſolideſcit, vires acquirit: fere omnes petechiæ flavent.

28. in omnibus digitis nigredo diſparuit, adeſt magna ſuppuratio: omnia ſenſim continuant in melius verti.

2. Martii multæ petechiæ diſparuere: reliquæ omnes palleſcunt: Pulſus eſt ſat plenus & fortis, ſolidus, pacatiſſimus: reliquæ functiones bonæ.

14. Martii, ultima phalanx digiti minimi & vicini ſponte exciderunt; & levi adhibita vi media pars phalangis ultimæ pollicis ſeparata eſt: Æger optime habet: nauſeat Camphoram, aitque ab illa ſibi caput grave fieri: hinc dentur tantum quater in die illius gr. xv. quæ iterum libenter ſumit. valde appetit: quare præter alia alimenta carnes ipſi conceduntur.

29. Martii ſecundus & tertius digitus cicatrice obducti ſunt: reliqui optime continuantes ſuppurare, incipiunt cicatrizari. Miſ-

ſus

ſus fit internus Camphoræ uſus, & datur omni octiduo lene purgans. deligatio fit ut ante.

20. Aprilis omnes digiti, excepto pollice, cicatrice obducti.

10. Maji omnia cicatrizata ſunt, & Æger optime habens brevi poſt dimiſſus eſt.

CASUS VIGESIMUS PRIMUS.

Piſtor toroſus, robuſtus 28. circiter annos natus circa mediam Januarii anni 1771. in ſuperiori externa dextri cruris parte phlegmone correptus eſt, quæ in ſuppurationem abivit: diu malum flocci fecit robuſtus homo, donec incedere non amplius potens ad aliquod hujus civitatis Noſocomium ſub finem Februarii curavit ſe deferri: ubi 2. Martii, facta ſuperius prope genu inciſione, apertus abſceſſus multum Puris tenuis, flavi dedit: apertura poſt 10. vel 12.

dies coaluit, & inde exivit, crure adhuc tumido, tenſo, debili.

Solitos labores denuo aggreſſus eſt, & utcumque peregit uſque ad 26. Martii ejusdem anni, qua ſaccum magnum farina plenum humeris portans ſubito circa articulationem oſſium cruris dextri cum oſſibus Tarſi omnia integumenta diſrupta ſunt: unde in terram cum onere ſuo cecidit.

Varia curavit applicari herus illius per 4. dies abſque effectu, & rebus ad peſſimum ſtatum redactis illum trigeſima Martii ad noſtrum Noſocomium transferri curavit.

Circum totam cruris cum Tarſo articulationem omnes tendines, & etiam ipſe tendo Achillis ad trium digitorum transverſorum latitudinem nudi, laxi: elevato crure pes in omnem partem collabebatur, quaſi tantum filis laxis elongatis cruri adhuc hærens: crus & pes valde tumida, livida: pes inſenſibilis, frigidus: crus adhuc parum calet, & attactum

ctum percipit : Ulcus circumquaque nigram ſaniem fundens, ſupra malleolum externum apertura erat communicans cum ſinu per totum crus, excepta parte poſteriore interna pollicem lata, ſub integumentis fere uſque ad genu decurrente & Ichorem fœtidum fundente.

Reſpiratio eſt lenta, tarda, inæqualis: arteria tenuis, quaſi aerem rarefactum continere videtur : pulſus eſt lentus, tardus, debilis, inæqualis: Color faciei & reliquæ cutis ſordidus, fuliginoſus: oculi languidi, luridi.

De Ægro actum eſſe credimus omnes: datur tamen omni trihorio Camphoræ dr. ß. ut dr. II. in die abſumat: totus ſinus cruris, quod exterius fomento antiſeptico diligenter foveri jubetur, mucilagine N. 5. impletur: Ulcus & pes eadem mucilagine ſæpius renovanda teguntur.

31. Martii nil in deterius vertitur: immo reſpiratio melior videtur.

1. Aprilis livor cruris & pedis diſparuit: nigra ab Ulcere ſeparantur: ex ſinu cruris pus effluit, vix amplius fœtens, tenue tamen adhuc & flavum. Reſpiratio æqualis: pulſus paulo melior eſt.

2. Aprilis, Ulcus purum eſt, hinc inde ſuppurat: ſinus cruris ſenſim pus melius dat: tumor cruris & pedis minuitur: calor & ſenſus in pedem redeunt; facies & oculi vividiores, nitidiores. Alvum coctam ſponte depoſuit: pulſus ſolideſcit, vires acquirit, magis æqualis eſt, minime febrilis. Fomenta continuentur: Injectio & deligatio cum mucilagiue camphorata tantum bis in die fiant, & pergat Æger quotidie camphor. dr. II. abſumere.

3. Aprilis pus copioſum, optimum ex cavo cruris effluit: Ulcus optime ſuppurat; mul-

multæ fibræ tendineæ abſcedunt, ſeparantur: & omnia continuant in melius mutari.

6. Aprilis, ſub continua optima ſuppuratione corruptæ tendinum partes continuant fibrillatim ſeparari: carnes recreſcunt: minuitur Ulceris ſuperficies: ſinus cruris minus injectionis capit: pulſus impletur, ſolidus, æqualis eſt: appetitus redit; reliquæ functiones ſunt naturales.

2. Aprilis, crus & pes colore & volumine omnino naturalia ſunt: Ulcus carnibus renatis impletum: nullus amplius tendo jam ab aliquot diebus oculo patet: circumcirca cicatricis rudimenta adſunt: cavum cruris vix tertiam prioris injectionis partem recipit. Omittitur fomentum; hujus loco linteis ſiccis involvitur crus: Ulcus more ſolito deligatur: pergit Æger eandem Camphoræ doſin ſumere, ac ante.

4. Maji Ulcus totum Cicatrice obductum eſt, excepta parte illa, quæ aperturæ ſinus

cruris, jam fere evanidi & tantum parum Puris optimi nunc dantis ſubjacet. A Medicamento abſtineat: cibi copioſiores & ſolidiores ipſi porrigantur.

12. Maji, omnia conſolidata ſunt: incipit cruri inſiſtere.

Initio Junii ſanus, optimo cruris & pedis uſu gaudens dimittitur.

CASUS VIGESIMUS SECUNDUS.

Puella 12. annorum 5. Decembris 28. variolarum confluentium die ad noſtrum Noſocomium veſpere defertur.

Frigus cadaveroſum in toto corpore erat: totam faciem cruſta nigra, denſa, quæ jam ter exciderat, & ſemper renata fuerat, occupabat: totum corpus confertis variolarum veſtigiis profunde excavatis, ſicco quaſi muco obductis deturpatum, cadaveris jam putreſcentis ſaturatiſſimum fœtorem ſpar-

ſpargebat: reſpiratio erat rara, tarda, inæqualis, ſtertoroſa: pulſus flaccidiſſimus, ſæpe vix perceptibilis: brevi animam efflatura creditur. quare præter gratum cardiacum & juſcula nihil præſcribitur.

6. Decembris, cum illam adhuc viventem & utcumque liquida deglutientem mane invenerim, juſſi ut omni bihorio Camphor. gr. xv. ut per diem dr. II. abſumat, porrigantur: faciei, manibus valde exeſis & omnibus corporis ulceribus omni trihorio lintea mucilagine camphorata dilutiori impraegnata applicantur, interpoſito ſubinde carnium juſculo, ſpiritu vitrioli acidulato.

7. Decembris videtur reviviſcere: dictam Camphoræ doſin facile ſumit, & bene fert.

8. Decembris totum corpus natnralis calor pervaſit, nec minimus fœtor amplius obſervatur: omnia Ulcera optimo Pure ſcatent: ſtertor diſparuit; pulſus & reſpiratio

ſenſim meliores fiunt: cruſtæ omnes deciderunt.

11. Decembris, Ulcera manuum cicatrizata ſunt: magna pars faciei jam cicatrice obducitur: reliqua optime ſuppurant: pulſus eſt ſat plenus, ſolidus, liber, æqualis: reſpiratio optima: ſola ſe in lecto erigit. juſcula acidula nauſeat: hinc acidum omittatur & ſumat tantum ſexies in die Camphor. gr. x.

18. omnia continuo in melius vergunt: abſtineat a medicamento.

25. Decembris omnia ubique Ulcera cicatrice obducta ſunt: optime valet: per cubiculum deambulat: functiones omnes optimæ: conceduntur ipſi carnes.

Cum utroque parente orbata eſſet, ſervata eſt in Noſocomio per binos menſes, ubi ſemper bene habuit, & poſtea ſanam aliqua civis miſericordia mota ſuſcepit.

CA-

CASUS VIGESIMUS TERTIUS.

Lotharinga fœmina 2. Decembris anni 1771. ad noſtrum Noſocomium cum Puella ægrotante, nondum quartum ætatis annum emenſa, venit;

15. dies erat ex quo cum frigore anxietate & ſubſequente calore, poſtea continuo, inceperat ægrotare.

Quarta morbi die variolæ diſcretæ conſertim per totum corpus eruperunt.

Navi Viennam ſeptima morbi die advecta Ægra diu noctuque ſub dio aeri frigido & humido abſque ullo auxilio expoſita fuit, & 8. morbi die, omnes variolæ exceptis 14. quæ in trunco remanſerunt, fere ſubito diſparuere: parvula ſtatim delira facta eſt, & quoad omnia miſerrime habuit: manſit tamen abſque auxilio, donec ad nos delata fuerit.

Con-

Continuabat delirium: pulſus erat mollis, valde febrilis: reſpiratio laborioſa, anxia, ſtertens: debilitas magna: totus corporis habitus tam dolens, ut ad levem attactum ejularet parvula: lingua glabra, ſicciſſima: reſiduæ variolæ ſuppuratæ latas & profundas foveas fecerant.

Applicantur ſuris bina veſcicantia: Enemata emollientia injiciuntur: præſcribuntur medicamenta demulcentia, diaphoretica, expectorantia, leniter antiſeptica, quibus abſque levamine per tres dies adhibitis, 5. Decembris ſequens præſcribitur medicamentum.

℞. Aq flor. Tiliæ unc. IV.
Spirit. vitriol. gtt. XV.
Cort. Peruv. ſelectiſſimi.
Subtiliſſime pulveriſati dr. II.
Syrup Altheæ unc. II.
M.

S.

S. Nychtemeri ſpatio abſumat & Decocto Pectorali ſimul utatur. ſic ad 8. Decembris abſque minima in melius mutatione continuavimus: immo reliquis malis ſymptomatibus acceſſit pulſus flacceſcentia, magna irregularitas, & vires ita collapſæ ſunt, ut morti proxima videretur: quare miſſis aliis medicamentis ſequentem præſcripſimus mixturam.

℞. Gumm. Arabic. dr. II.
Solve in Aq. flor. Tiliæ unc. IV.
Dein terendo diligenter admiſce.
Camphor Scr. IV.
Syr. Capill. Vener. unc. II. ß.
d. u.

Ut diviſis doſibus quotidie abſumat. 9. Decembris, pulſus jam minus malus eſt: ſtertor tantum per intervalla auditur: delirium minus: Alvus, quæ toto tempore quo apud nos jacet, quotidie quinquies, ſexies ſe-

ſeceſſit, liquida, valde fœtens, minus fœtet, minus frequens eſt.

10. Decembris, pulſus ſolideſcit, plenior fit, ſat regularis eſt, modice tantum febrilis: diſparuit ſtertor: reſpiratio facilior, liberior eſt: delirium nullum: alvus naturalis eſt: lingua humeſcit: cutis, ut ante, abſque ſudore mollis: ſæpe bene dormit: Ulcera a variolis relicta humeſcunt, ſuppurant: teguntur parvis emplaſtris.

13. omnia continuant optime procedere: vires ita creſcunt, ut hodie ſola ſe in Lecto erigat, & ſat diu ſedens maneat: optimus eſt appetitus dolor totum corporis habitum antea occupans, fere integre diſparuit: lingua eſt pura: ſudor nullus: Alvus naturalis. Continuat eandem Medicamenti doſin ſumere.

17. Decembris, omnes functiones ſunt naturales, excepta excretione Alvi, quæ de-

denuo incipit hodie frequentior fieri. miſſa ſit Camphora & Alvus ſibi relinquitur.

21. Decembris, Alvus aquoſa quotidie quinquies, ſexies continuat ſecedere: abdomen fit dolorificum: ſubinde tuſſit Ægra. Datur Decoctum Salab cum Bolo Armena & Syr. Diacod. quod per 5. dies continuatum omnia ad ſtatum pacatum naturalem reducit.

Parvula ob excedentem paupertatem & defectum Azyli ultra duos menſes in Noſocomio ſervata, brevi vires recuperavit & ſana manſit.

CASUS VIGESIMUS QUARTUS.

Puella 13. annorum 19. Decembris mane alternantibus frigore & calore cum frequenti vomitu, capitis dolore & magna totius corporis laſſitudine corripitur: circa veſperas ceſſante frigore & vomitu reliqua conti-

tinuant ſymptomata: ſumit Emeticum. 23. ad nos deſertur.

Valde debilis eſt: de ventriculi & capitis doloribus conqueritur: Alvus eſt laxa: urina naturalis: Lingua humida, lurida: facies & oculi triſtitiam exprimunt. Sitis mediocris: appetitus nullus. cutis mollis, flaccida, maculis latis figuræ irregularis, fuſcis obſita: inter quas multæ aliæ maculæ minores rubræ interſperſæ ſunt: reſpiratio naturalis: pulſus debilis, flaccidus, vix febrilis.

Datur infuſo Decoctum ex emollient. & leniter aromaticis cum ſpiritu vitrioli. Nox ſequitur inſomnis.

24. Decembris mane loco macularum rubrarum inter fuſcas petechias papulæ minimæ aſſurgere videntur, quas variolas futuras ſuſpicamur: pulſus eſt valde febrilis, debilis, fere vacuus, ſubinde tenſus: tuſſicula frequens: lingua ſordida, alba: reliqua ut heri. Loco prioris medicamenti dantur

illi

illi omni bihorio Camphor. gr. x. ut per diem dr. I. ſumat.

25. papulæ non creſcunt: petechiæ immutatæ permanent: Urina fuſca poſt aliquot horas ſedimen copioſum furfuraceum, flavum, flocculis lanuginoſis mixtum deponit: reliqua ut heri. dantur per diem Camphor. dr. II.

26. variolæ diſcretæ milii parvi habent magnitudinem: Petechiæ multæ rubent: Alvus bis ter in die laxa ſecedit: Urina bona: lingua pura: cutis mollis, perſpirans: tuſſis nulla: pulſus minus debilis, vix amplius febrilis, ſoliditatem acquiſivit: facies incipit parum tumere.

27. Variolæ elevantur ſphæricæ, rubentes: omnium circumferentia rubra: in facie, jam valde tumida, ut vix oculos amplius aperire poſſit, incipiunt ſuppurare: pulſus bonus, tantum 78. pulſationes intra minutum horæ habet. Petechiæ omnes rubent.

Paucis: morbus varioloſus ſtadia ſuppurationis & exſiccationis abſque febre ſecundaria benigniſſime percurrit: & 31. Decembris de petechiis nihil amplius ſuperfuit.

6. Januarii, ex facie, trunco & artubus ſuperioribus cruſtæ omnes exciderunt: in artubus inferioribus puſtulæ omnes exſiccantur. Miſſam facimus Camphoram: Ægra ſumit lene purgans, quod 12. & 15. Januarii repetitur: omnes cruſtæ nullis relictis excidere foveis: puella optime habens ad ſuos remittitur.

CASUS VIGESIMUS QUINTUS.

Puella 24. annos nata, ſexta Octobris 1772. ad noſtrum Noſocomium venit.

Prima ipſi 14. ætatis anno erupere menſtrua, copioſa & regularia, donec 15. fere annos nata abſque nota cauſa emanſerint. non diu poſt menſtruorum ceſſantium periodum

dum febri acuta correpta eſt, ex qua multis ut ait venæ ſectionibus & paucis aſſumptis medicamentis poſt tres circiter ſeptimanas evaſit.

Menſe circiter ab exantlato morbo elapſo denuo rediere menſtrua copioſiora & minus regularia quam ante, utpote ſæpe bis quatuor ſeptimanarum ſpatio, modo per tres quatuorve, ſæpius per octo dies copioſe fluentia: donec viginti annos nata denuo acuto morbo affecta fuerit, a quo iterum aliquot Venæ ſectionibus adhibitis & quibusdam medicamentis aſſumptis poſt tres quatuorve ſeptimanas perfecte fuit reſtituta.

Poſt hunc ultimum morbum menſtrua evacuatio irregulari tempore ſemper acceſſit, fuitque multo paucior ſolito: puella pinguеſcere cœpit & cito valde obeſa facta eſt.

22. ætatis annum agenti tumor mobilis Nucem Juglandem æquans ipſi ſupra ſuperiorem externam brachii ſuperioris dextri

partem ortus eſt, qui ſenſim mole abſque dolore increvit, & quem fruſtra multis remediis in & externe applicatis conata eſt auferre.

28. annos nata incepit emaciari, & dum ad nos venit, valde emaciata erat, cuti reſiduisque carnibus per totum corpus laxiſſimis, pendulis: Coloris cachectici flavo-viridis. Tumor magnus, mollis ſuperiori brachio lata baſi inſidebat mobilis.

6. Octobris datum purgans: 7. quievit. 8. tumorem Atheromatoſum peritiſſime & cito coram celeberr. Chyrurgiæ Profeſſore Leber, multis aliis Chyrurgis & Medicis enucleavit expertiſſimus Noſocomii Chyrurgus Wallner. More in talibus caſibus ſolito deligatum eſt Vulnus: bona Diæta, Medicamenta demulcentia, paregorica præſcripta ſunt.

11. Octobris nulla adhuc ſuppuratio: præter reliqua dantur Ægræ quater de die

De-

Decocti lignorum unc. IV. unguento digeſtivo admiſcetur unguentum de Styrace & Ulcus fomento corticis Peruviani & aliorum antiſepticorum diligenter fovetur.

15. his non obſtantibus tantum ſeroſum quid loco Puris ex Ulcere effluit. Datur quater de die cort. Peruv. dr. I. quam difficile ſumit.

20. Octobris totum Ulcus gangræneſcit: corticem cum nauſea ſumit, & ſubinde vomit: Pulſus eſt valde febrilis, irregularis: reſpiratio crebra, celeris, anxia &c. ſaturatiſſimo corticis Peruviani decocto, cui aliæ Herbæ antiſepticæ infuſæ erant, deligatur Ulcus, & eodem diligenter fovetur.

21. omnia continuo in deterius vergunt: vix amplius poteſt perſuaderi, ut corticem ſumat.

22. Octobris quomodocumque datum corticem evomit: delirat: facies collapſa, ſordida, fuliginoſa: Oculi in orbitis profun-

de hærent luridi, triſtes: lingua nigra, aridiſſima: ſitis nulla: decubitus ſupinus: reſpiratio valde laborioſa, crebra, irregularis, ſæpe ſublimis: pulſus creberrimus, celerrimus, ut impoſſibile ſit pulſationes numerare, ſumme inæqualis, irregularis, vacuus: arteria modo flaccidiſſima, modo leviter tenſa: calor urens: ſummus virium collapſus: Ulcus duas tertias brachii partes ambiens, cujus menſura perpendicularis ab humero verſus cubitum fere quinque pollices pariſinos æquat, gangræna nigra ſicca totum occupatum eſt: totum brachium & manus valde tument.

Dantur omni trihorio Camphoræ gr. xv. ut per diem dr. 1. ß. ſumat. Ulcus linteis carptis mucilag N. 5. fortiori impraegnatis ter de die renovandis, admoto ſæpius fomento calido ter de die deligatur.

23. Reſpiratio videtur paulo melior.

24. Ulcus humeſcit: ſuperius parum Puris diluti dat: pulſationes Arteriæ ſunt magis diſtinctæ, minus præcipites: reſpiratio magis regularis, minus difficilis: calor blandus, non urens. Pulvere Camphoræ totum ulcus tegitur applicata deſuper mucilagine, apparatu bis in die renovando: & totum brachium fomento calido involvitur ſæpe applicando.

25. Veſpere, in ſuperiori Ulceris parte ſeſqui Pollicis magnitudine magna ſuppuratio adeſt: in reliquo Ulcere omnia nigra, ſed humida, ſaniem multam fundentia: In toto ambitu Ulceris rima adeſt, quaſi cultro profunde inciſa gangrænoſum a ſanis ſæparans. reſpiratio eſt libera, crebrior tamen adhuc & celerior naturali: pulſus ſat ſolidus eſt, liber, regularis, dilatatus, ſat fortis, multo minus febrilis. facies & oculi reviviſcunt: ceſſavit delirium: Alvus ſponte deponitur cocta: cutis mollis, perſpirans eſt.

26. Omnia ſeparata, excepta parva plaga in parte Ulceris inferiori.

27. Omnia pura optimum & copioſum Pus dant: ſed reſidua poſterior integumentorum pars, Ulceri reſpondens, conſumpto panniculo adipoſo a ſubjectis muſculis tota abſcedit, excepta parte media pollicem medium lata cum ſubjacentibus adhuc cohærente. Tendo bicipitis nudus eſt, & magna deltoidis pars conſumpta.

28. Pulſus ſolidus, mollis, liber, Apyretos; reſpiratio naturalis: omnia in melius mutata. pergit eandem Camphoræ doſin quotidie ſumere.

30. Tendinis bicipitis filamenta multa abſcedunt, ſeparantur: omnia bene procedunt. Cum valde magna ſubſtantiæ deperditio facta ſit, denuo ſola Mucilag N. 5. deligatur, ut citius renatis carnibus cavum impleatur: Cavitati ab abſcedentibus integumentis factæ

&

& multum ſuppuranti idem medicamentum immittitur.

12. Novembris, totum brachium detumuit: Ulceris ſuperficies integumentis parallela eſt: ſed in illo tres excreſcentiæ ſeptenarii magnitudine, cinerei coloris ſunt: quare plumaceolis mucilagine camphorata imbutis Camphoræ ſtratum inſpergitur, Ulceri applicandum, ut bona ſuppuratione eo ſecurius conſumantur. Cavum inter muſculos & integumenta abſcedentia minuitur, purum eſt: nulla amplius plumaceola interponuntur, ſed tantum inſtillatur mucilago & leni preſſione ſibi viciua retinentur: in ſuperiori ulceris parte cicatrix jam incepta eſt: Ægra quoad omnia in melius pergit mutari; perfecte apyretos eſt, & quotidie Camphor dr. 1. ß. abſumit.

16. Novembris pes & crus ſiniſtrum prægreſſa aliquot horarum febricula Eryſipelate cum tumore ſat magno occupatur: Eryſipe-

late formato pulſus eſt bonus, Apyretos. nihil in methodo medendi mutatur.

23. Novembris, Eryſipelas & pedis ac cruris tumor fere integre diſparuerunt: integumenta poſteriora a carnibus ſeparata illis iterum perfecte agglutinata ſunt, & inde antroſum cicatrix incipit extendi: ſic a poſteriori externa & ſuperiori ulceris parte ſenſim aucta Cicatrice, Ulceris ſuperficies multum minuitur: in medio tamen videtur excreſcere nimis: quare miſſa mucilagine, ſola Camphora ſicca ſuperpoſitis deſuper plumaceolis ſiccis deligatur, & pergit Ægra eandem, ac ante, medicamenti doſin abſque minimo incommodo ſumere.

4. Decembris Cicatrix undique verſus Ulceris centrum extenditur, & Ulceris apparens nimia elevatio, illa accedente, deprimitur, diſparet: pes & crus naturalia ſunt: color cachecticus in ſanum mutatus eſt: carnes toto corpori augentur, firmæ ſunt: vi-

res

res ſunt optimæ, & Ægra bonam diei partem per cubiculum deambulat.

10. Decembris, heri poſt prandium caput grave factum eſt: Nox fuit minus bona ſolito: hodie, præter capitis gravitatem, torporem conqueritur, & ait ſe ſenſum tenſionis & tumoris per totum corpus pati. Pulſus eſt plenus, ſolidus, parvus, minime febrilis. Miſſus fit Camphoræ internus Uſus. Ægræ jam in tertium menſem menſtruis carenti Vena in pede ſecatur: deligatio Ulceris quod in ſuperiori parte parva plaga fungoſe excreſcit, continuet ut ante, Camphora ſicca fieri.

16. Decembris in ſuperiori Ulceris parte fungus mollis mediæ nucis juglandis magnitudine excrevit, cui ſacrificato oleum Camphoræ cum Spir. Nitri fortiſſimo paratum inſtillatur, illique plumaceolum eodem Oleo imbutum ſuperponitur. Reliquum ut ante deligatur: Ægra denuo Camphor dr. 1. cum

Ni-

Nitri dr. ß. incipit per diem ſumere. Pulſus eſt collapſus, mollis, liber, & omnes functiones bonæ.

Ab applicatione olei Camphoræ Eſcharæ molles factæ ſunt, fere ſponte ſecedentes, & ſic fungoſitate fere integre conſumpta denuo Camphora ſicca 19. Decembris deligatio facta eſt.

26. Decembris, pulſus eſt pacatiſſimus, mollis, liber: omnes functiones bonæ: ut acceleretur Ulceris cicatrizatio, denuo quotidie Camphor dr. 1. ß. abſque nitro abſumit.

2. Januarii 1772. Ulcus ſenſim magis magisque cicatrice obducitur. Datur ipſi purgans. miſſus fit Camphoræ internus uſus. circa medium Februarii coaluit ulcus. optima ſanitate fruitur & brevi poſt dimittitur.

CA-

CASUS VIGESIMUS SEXTUS.

Puellam 20. annorum ſanguinei temperamenti, toroſam 17. Novembris 1772. in Noſocomium curandam ſuſcepimus.

Hæc Puella variolas & morbillos ante pubertatem paſſa, alias ſemper ſana, 16. ætatis anno menſtruis prima vice gaviſa eſt, quæ ab eo tempore ſat copioſe, regulariter fluxere: donec menſe Junio hujus anni, fratre, ipſius uxore & tota ipſius familia morbo petechiali, quo durante cuſtodis vices apud omnes egerat, extinctis, in magnum mœrorem lapſæ emanſerit periodica menſium evacuatio & puella eodem, quo illi, quibus inſervierat, morbo putrido Epidemico correpta fuerit.

Hoc morbo graviſſime & diu decubuit: negligenter tractata fuit, & evaſit intumeſcente pede ſiniſtro: tumore cito totum crus & femur ad coxam uſque abſque dolore occupante.

Sub

Sub finem Julii ſcabies purulenta in utraque manu & crure ſiniſtro erupit, quæ poſt quindecim dies ſponte diſparuit, & brevi denuo erupit, aucto ſenſim cruris tumore, quod brevi maculis latis, cœruleis, fuſcis, cito in Ulcera abeuntibus notatum eſt, & greſſus præ dolore factus eſt difficilior.

Ulcera tantum gluten viride tenax in fila ducendum dederunt: erant autem, dum in Noſocomium ſuſcepta fuit, horum ſeptem: tria ſuperficialia in pede: quatuor profunda floreno majora, unum internam inferiorem, aliud mediam anteriorem, tertium externam, quartum internam ſuperiorem cruris partem obſidebant; Femur parum tumebat: Crus valde tumidum, tenſum, elaſticum, frigidum, ab attactu valde dolens, colore fuſco, maculis latis, cœruleis, hinc inde interſperſis tinctum erat: Color faciei flavofuſcus: pulſus pacatus, mollis, æqualis, appetitus nullus, reliquæ functiones ſat bonæ.

Da-

Data ſunt illi quater in die Camphoræ gr. xv. Ulceribus denſum pulveris Camphoræ ſtratum bis de die inſperſum eſt, & totum crus & pes pannis mucilagine camphorata vaſe clauſo tepefacta impraegnatis, aliquoties in die renovandis, involuta ſunt.

Tertia ab uſu Medicamenti die, crus valde collapſum erat: omnia Ulcera pura ſuppurabant.

24. Novembris Crus indolens molem & colorem naturalem denuo habet: omnia Ulcera pulchre ſuppurant, miſſa ſit mucilago.

6. Decembris Ulcera pedis & ſuperius internum cruris ulcus cicatrice obducta ſunt: reliqua verſus ſuperficiem, aſſurgente fundo, optime continuant ſuppurare.

12. Decembris puella, quæ hucuſque Camphoram bene tulit, ait ſe heri veſpere poſt medicamentum aſſumptum, multum capite incaluiſſe: lenes tendinum ſubſultus aliquoties paſſam eſſe: Caput gravius eſſe

ſo-

ſolito. Pulſus eſt plenus, ſolidus, parvus: Appetitus autem optimus & reliquæ functiones bonæ. Interno Camphoræ uſui ſuperſedetur: ejus pulvere continuant deligari Ulcera, & datur Puellæ purgans.

19. Decembris Ægra ab aliquot diebus anxietates, calores continuat per vices conqueri: pulſus ut ante: vena hodie in brachio ſecta, eductus eſt ſanguis omni nota bonus.

2. Januarii licet valde immorigera Ægra a 15. diebus cruri nullo modo pepercerit, omnia Ulcera coaluerunt, & Ægra optime habens ex Noſocomio diſcedit.

CASUS VIGESIMUS SEPTIMUS.

Puellæ 24. annorum 15. ætatis anno prima erupere menſtrua, quæ ordinario per 4. 5. dies fluentia, tempore & copia irregularia ſemper fuere.

A pueritia ad 18. ætatis annum, ſi variolas & morbillos facile exantlatos excipias, nullum morbum paſſa eſt: 18. ætatis anno febri continua, putrida ſat diu decubuit, poſt quam uſque ad 22. ætatis annum, licet menſtrua æque irregularia fuerint, ac ante, ſana vixit.

22. ætatis anno emanſere menſtrua, fluor albus blandus adfuit continuus & in utroque inguine erupit Bubo, qui nullis adhibitis medicamentis in ſuppurationem abiverunt, ſponte aperti ſunt & coaluerunt, manente fluore albo, benigno.

Ante biennium poſt uſum balnei aquæ dulcis frigore, lumborum doloribus & abdominis validis torminibus correpta eſt: multa materies fuſca, tenuis, inodora ex vagina effluere incepit: acceſſit vehemens cum capitis dolore & totius corporis magna laſſitudine calor: vena ſecta, omnia ſymptomata ceſſarunt: continuavit autem flu-

xus materiæ tenuis, modo fuſcæ, modo viridis, minime urens: cui ſubinde menſtrua ſanguinis evacuatio ſociabatur.

Sub finem Maji anni 1772. ad nos venit tota emaciata, coloris flavo viridis & ita debilis ut vix loco ſe movere poſſet. omnes functiones læſæ: hypogaſtrium valde dolens: materies ex genitalibus effluens copioſiſſima, tenuis, varie colorata, fœtidiſſima.

Variis trium menſium ſpatio adhibitis magnum levamen habuit, quare credens omnia bene proceſſura, non potuit diutius in Noſocomio retineri.

Manſit per quinque ſeptimanas extra Noſocomium & 8. Octobris redivit multo pejus habens, quam ante.

Dolores lancinantes in artubus, diu noctuque æquales, ſubinde recurrentes patitur: ſub ſomno in pectore & collo multum ſudat: debiliſſima eſt: tuſſitat: pulſus eſt debilis, parvus, laxus: ab aſſumptis cibis angitur:

tur:

tur: cutis color valde cachecticus: Hypogaſtrium præcipue parte ſua ſiniſtra tumidum, tenſum, durum, valde dolens: fluxus materiæ viridis fuſcæ copioſiſſimus, valde fœtidus, vaginam tamen hucuſque non excorians.

Omni arte uſque ad 13. Decembris adhibita levamen huic miſeræ adferre incaſſum conamur: omnia in deterius vergunt: & tantum fœtorem ſpargit, ut fere impoſſibile ſit illum ſuſtinere.

13. Decembris præſcribitur ſeqnens medicamentum.

℞. Gumm. Arabic unc. ß. ſolve in aq. pur. unc. VI. cui terendo admiſce Camphor dr. VI. D. in vitro. tepefiat in aqua tepida vaſe clauſo, & fiant inde mane & veſpere injectiones in uterum & præter Docoᴄtum emolliens, pectorale, ſumat

Ægra quater in die Camphor. gr. xv.

14. Decembris fœtor multum minuitur, 15. vix fœtor amplius adeſt: fluxus fit parcior, ſpiſſior: molleſcit hypogaſtrium, minus dolet.

20. Decembris Hypogaſtrium integre collapſum, molle, vix amplius dolens: fœtor nullus: fluxus materiæ albeſcentis valde paucus; ſub injectionibus dolet in lumbis & medio quadrante horæ poſt injectiones, dolores lenes, urentes in utero patitur: dein abſque dolore eſt: pulſus melioratur. Alvus naturalis: Urina bona: appetitus nullus.

26. Decembris datur Ipecacuanh dr. ß. ob ventriculi repletionem de qua conqueritur, & inappetentiam: inde pluries vomit aquoſa, pauco muco mixta: diſparet ſenſus repletionis: ſequenti die erumpunt menſtrua fuſceſcentia, quæ per triduum pauca copia flu-

fluxerunt. Omiſſæ ſunt hoc triduo injectiones: priorem Camphoræ doſin continuavit ſumere.

30. Decembris, incipit Camphor. dr. I. ß. quotidie abſumere: injectiones fiunt ut ante: Color Cachecticus in ſanum mutatur: carnes renaſcuntur, firmiores fiunt: vires redeunt & mentis alacritas.

2. Januarii, omnia continuo in melius mutantur: Appetitus eſt magnus. conceditur carnium teneriorum uſus: & dantur Camphor dr. II. per diem abſumendæ.

9. Januarii 1773. a Camphora vertigines lenes, cito evanidas, conqueritur. continuat bene habere: de putrido fluxu nihil ſupereſt. hypogaſtrium molle, indolens eſt. in collo ſex glandulæ intumeſcunt & jam Nucis Juglandis magnitudinem adeptæ ſunt. miſſus fit Camphoræ uſus: & alia curandi via initur.

CASUS VIGESIMUS OCTAVUS.

Puella 40. annorum in pueritia a matre per plures annos frequenter pugno in nate dextra pecuſſa fuit: ortus eſt inde tumor mobilis, parvus, qui ſub repetitis ejusmodi percuſſionibus ante pubertatem jam caput infantis magnitudine æquabat.

18. ætatis anno prima ipſi erupere menſtrua, quæ ſemper fuere pauca, valde irregularia. hisque nunc jam a triennio penitus caret.

Poſt menſtruorum primam eruptionem ſemper valetudinaria fuit: preſſus tumor dolere cœpit: quare ab eo tempore, non niſi nati ſiniſtræ inſidere potuit.

Famulatu vitam ſuſtentavit: donec tumore Gangræna jam a pluribus diebus occupato & exhauſtis viribus, laboribus domeſticis impar malum, quod hucuſque præ pudore celaverat, revelare coacta fuerit.

Pau-

Paucis incaſſum adhibitis medicamentis 17. Novembris anni 1772. ad noſtrum Noſocomium delata eſt.

Gerebat tumorem Atheromatoſum valde craſſum, ad poplitem uſque deſcendentem, lata baſi natem dextram & ſuperiorem femoris partem occupantem media parte inferiori lividam, frigidam: color corporis valde emaciati flavo viridis erat: magna per totum corpus laxitas: virium magna proſtratio alvus tarda: appetitus nullus: ſitis mediocris: ſudor frequens & multus: pulſus tamen ſat bonus, & reſpiratio naturalis.

Datur ipſi quater de die cortic: Peruviani dr. 1. Præſcribitur diæta eupepta, antiſeptica: latus tumor antiſepticis diligenter fovetur: quibus non obſtantibus gangræna ſenſim magis verſus tumoris baſin adſcendit.

Vigeſima Novembris expertiſſimus noſtri Noſocomii Chyrurgus Dominus Wallner totam maſſam perfecte enucleando abſtulit:

& ſollicite applicatis optimis medicamentis, Ægra ut ante, cortice & aliis pergente uti, conatus eſt ad ſuppurationem ducere Ulcus, quod 24. Novembris incepit pus tenue dare. A Cortice valde anxia fit Ægra: ait ſibi omnia circa ventriculum & hypochondria conſtringi: frequentes habet vomendi conatus: qui, miſſo cortice, cito evaneſcunt.

1. Decembris multum ſuppurat Ulcus: ſed valde flaccida ſunt omnia: pus tenue, virideſcens: redditur prior corticis doſis, quam Ægra repugnanter ſumit: digeſtivo compoſito deligatur ulcus & deſuper fomentum ex Decocto corticis Peruv. & aliis herbis antiſepticis illi infuſis paratum ſæpius applicatur.

Pus his non mutatur in melius: immo 12. Decembris incipit fœtere macula livida, unciam lata, ſeſqui unciam longa, licet nunquam in dorſum decumbat Ægra, Os ſacrum occupat. ſaturatiſſimo Corticis Peruviani Decocto, cui alia antiſeptica addita ſunt, de-

deligantur omnia, diligenter foventur. uſus corticis peruviani internus continuatur.

16. Decembris, omnia circum Ulcus laxo tumore valde diſtenta: margines circumquaque nigri: Ulcus 8. Uncias pariſinas longum, $5\frac{1}{2}$. uncias latum, quod cavitate ſua caput infantis capere poſſet, copioſum pus valde tenue, viride, fruſtulis nigris mixtum, fœtidiſſimum dat: Macula Os ſacrum occupans nigra eſt; Ægra jam ab octiduo ſudoribus frequenter diffluit. Pulſus eſt valde febrilis, vacuus, modo flaccidus, modo tenſus, debilis: reſpiratio crebra, celeris, anxia, ſæpe ſublimis: lingua ſicca, nigra: ſitis vix ulla: oculi luridi: debilitas ſumma.

Dantur Ægræ ſexies per diem Camphor gr. xv. Ulcus plumaceolis Mucilag N. 4. fortiori imprægnatis, ſuperſtrato multo Camphor. pulvere deligatur, apparatu ter in die renovando: eadem mucilago muculæ nigræ Oſſis ſacri applicatur.

17. fœtor minor: reſpiratio facilior: pulſus minus febrilis. ſumat Ægra ſexies in die Camphor Scr. 1.

18. reſpiratio naturalis: pulſus mollis, ſolidus, æqualis, pacatiſſimus: vires meliores: lingua humida depuratur: ſudor minuitur: Appetitus redit: totum Ulcus & ipſius margines excepta parte ſuperiori adhuc gangrænoſa, pus ſpiſſum, ſubflavum, minime fœtidum dat; muſculi in fundo Ulceris nudi exeſi circumjacentium integumentorum tumor collabitur: loco muculæ in Oſſe ſacro ulcus adeſt; quod jam aliquid puris dat.

22. omnia pergunt optime procedere. integumentis circumquaque penitus collapſis cavum ulceris ubique puri, optimum pus dantis valde minutum eſt: Ulcus Oſſis ſacri bene ſupurat, impletur: vires creſcunt: ſudor paucior, minus frequens.

28. Decembris a quinque diebus neque de die, neque de nocte amplius ſudat: pulſus

vo-

volumine augetur, ſolidus, æqualis, fortis, minime febrilis: reſpiratio optima: omnes functiones bonæ: Ulcus ſupra Os ſacrum cicatrizatur. Ulceris magni cavum renatis carnibus impletum, marginibus fere æquale eſt.

9. Januarii 1773. jam a 4. diebus ex lecto ſurgit: robuſta eſt, optime valet. Ulcus ſupra Os ſacrum coaluit: magnum natis ulcus, excepta parva parte mariani magnitudine, optima cicatrice obductum eſt: abſtinet a Camphoræ interno uſu.

20. Februarii integre curata eſt: carnes & vires corpori renatæ ſunt: brevi poſt dimittitur.

CASUS VIGESIMUS NONUS.

Operarius 25. annos natus, toroſus, robuſtus temperamenti ſanguinei, a pueritia ſemper ſanus morbo petechiali Epidemi-

mico hoc anno, adulto jam vere, decubuit, poſt quem optima ſanitate iterum gavisus eſt.

Ultima Novembris noctu in fœno calente profunde ſepultus noctem transegit: unde prima Decembris ſurgens, multum debilitatus erat, & oculus dexter multum intumuerat.

Tumorem hunc ingrato ſolummodo pruritu ipſi moleſtum per triduum neglexit: illo autem in valde magnam molem elato territus 4. Decembris ad nos venit.

Tumor palpebras valde diſtendens; ſuperius ad medium dextræ partis frontis, inferius ad maxillam inferiorem uſque extenſus, durus, elaſticus colore ex rubro fuſceſcente præditus erat. Pulſus mollis, liber, minime febrilis. Fomentum emolliens, reſolvens ex althæa, verbaſco, floribus ſambuci, chamomillæ, addito ſale ammoniaco diligenter applicatur, purgantia & alia revellentia adhibentur.

6.

6. Decembris Palpebræ nigræ ſunt: reliquum tumoris lividum: tumor idem ac prius: dolor nullus. ſtatum oculi ob magnitudinem & tenſionem tumoris palpebrarum æque parum ac ante videre poſſumus. pulſus & reſpiratio non videntur læſæ, reliquæ functiones bonæ.

Palpebræ hinc inde ſcarificantur: loca ſcarificata & totus tumor Mucilag. N.5. tegitur, ſæpius renovanda. dantur Ægro ſexies in die Camphoræ gr. xv.

8. Decembris tumor collabitur: loca ſcarificata ſaniem & hinc inde aliquid puris dant.

9. Decembris loco ſaniei ubique in locis ſcarificatis pus tenue, flaveſcens adeſt.

12. Decembris linea, quaſi cultro inciſa in ſuperiori orbitæ parte incepta, ſupra ſuperiorem naſi & externam malæ partem uſque infra Os Zigomaticum deſcendens circulum magnum deſcribit & mortua integumen-

menta a vivis ſeparat: hinc inde cutis fruſtula abſcedunt: tumor ubique multum collapſus: in gena & fronte color melior: oculus tamen hucuſque non poteſt examinari.

14. Decembris cutis fruſtillatim continuat ſeparari: ſuppuratio in locis cute orbis ſat bona, copioſa: diductis palpebris oculus ſanus invenitur. omnes functiones continuant eſſe ſat bonæ.

Gangrænoſa integumenta ſenſim ita abſceſſerunt, ut 20. Decembris tantum fruſtulum fabam majorem anglicam magnitudine referens prope canthum oculi externum ſupereſſet, firmiter adhærens: frons naturalis: cutis genæ virideſcens conſumpto panniculo adipoſo a ſubjacentibus ſeparata ad pollicis fere longitudinem: palpebrarum membrana interna integra: Tarſi integri: inferior deorſum revolutus. cœterum totum ulcus ſuppurat. pulſus eſt plenus, fortis, ſubdurus. capitis gravitatem conquæritur.

Tarſum palpebræ inferioris conatur Chyrurgus in ſitu retinere: totum ulcus eadem mucilagine deligatur: vena educuntur ſanguinis unc. XII. cujus inſula debitæ ſeri quantitati innatans, optimæ conſiſtentiæ, tenui cruſta phlogiſtica tecta eſt: & Æger a Camphora abſtinet:

22. Decembris ſuppuratio ubique paucior, minus bona. reſiduum gangrænoſum prope canthum oculi externum immobile perſtat. dantur Ægro quotidie Camphor dr. II. cum Nitri dr. ß.

24. Decembris optima eſt ubique ſuppuratio: & gangrænoſum in cantho oculi reſiduum ſenſim minutum tendinem tabo affecit: fibrillæ nigræ ab hoc ſecedentes, ſimul cum reliquo; cultro auferuntur. integumenta temporis dextri conſumpto panniculo adipoſo a ſubjacentibus late abſceſſerunt, & magnum ſinum formant, verſus Canthum oculi apertum.

2.

2. Januarii 1772. Æger dictam Camphor doſin optime fert. a ſuperiori orbitæ parte Cicatrix verſus tarſum, jam duas lineas lata deſcendit. ſinus ſuppurant quidem, ſed non minuuntur: cultro dilatantur & omnia Mucilag N. 5. deligantur.

12. Januarii integumenta ſinuum ſubjacentibus incipiunt uniri: ſinus minuuntur: palpebra ſuperior fere integre Cicatrice obducta. Æger quoad reliqua optime habens continuat quotidie Camphor dr. II. ſumere. valde appetit. conceditur carnium eſus.

Perrexit Æger quotidie Camphoræ dr. II. abſque incommodo ſumere uſque ad initium Februarii, quo tempore, cum omnia cicatrice obducta ſint, miſſus fit illius uſus. juvenis toroſus, robuſtus optime coloratus, quoad omnia optime valet.

CO-

COROLLARIA.

Camphora debite exhibita eſt omnium, quæ nota ſunt, efficaciſſimum contra putredinem Medicamentum: ſi doſi magnitudini mali adaptata porrigatur.

Putridam humorum diſſolutionem ſponte, vel a contagio natam cito ſiſtit: naturalem, ſanam ſanguini craſin ita reſtituit, ut ſub illius non admodum diu protracto uſu morboſa corpora ſanorum plethoricorum naturam, qualitates & ſigna induant.

Non habetur remedium, quod tam promppte, tam efficaciter Gangrænam partium ſolidarum ſiſtat, mortua a ſanis tam cito ſeparet.

Ubi Acrimonia Scorbutica, Rheumatica, Arthritica humores infecit ſpecie quadam putredinis, vires vitales & animales labefactantis, ut inde in variis locis decubitus materiæ acris cum dolore & ſubin partium

immobilitate fiant, Camphora efficax eſt remedium.

Ulcera inde nata in & externus Camphoræ uſus cito depurat, ad ſuppurationem ducit, curat.

Ulcera cancroſa a ſpeciali humorum & ſolidorum degeneratione orta, extra glandulas ſita, conſumpta fungoſitate, cicatrice firma abducit. immo mammæ cancro putreſcente, omnes functiones lethalibus ſignis imbuente affectam 84. annorum vetulam, quæ moribunda ad nos delata fuerat, in & externo Camphoræ uſu ultra duos menſes ſuſtinui: cito Gangrænæ ſucceſſit ſuppuratio: pulſus flaccidus, debilis, ſoliditatem & robur acquiſivit: manſit autem mala reſpiratio. poſt mortem inventi ſunt pulmones multis Scyrrhis & Vomicis materia mucoſa, nigra plenis obſiti, undique accreti. Pancreas parvum, duriſſimum: numeroſæ Meſen-

ſenterii glandulæ faba majori craſſiores, Scyrrhoſæ &c.

Sudores a putrida humorum diſſolutione & inde relaxatis ſolidis ortos putredinem corrigendo ſiſtit. Sitim . calorem, febrim, vaſorum tenſiones, tendinum ſubſultus ab acri putrido producta mirabili promptitudine tollit.

Vires a putredine proſtratas cito reſtituit, humores ad debitam conſiſtentiam & lenitatem, ſolidas partes ad ſanam firmitatem reducendo.

Excretionem acris in humoribus hærentis, illorum motum irritatis vaſis accelerantis cum ſanguinis minus firma craſi, ſedando vel minuendo febrim, promovet.

Emphyſemata in morbis putridiſſimis frequenter apparentia, ni jam integra humorum decompoſitio facta fuerit, cito diſſipat, & magni illi tumores latas plagas profunde

gangrænoſas circumdantes ſub uſu Camphoræ cito collabuntur.

Camphora non eſt remedium Prophylacticum contra Miaſma Epidemicùm morbos putridos producens: licet hujus Miaſmatis effectum, putredinem nempe humorum corrigat, vires ſuſtineat, erigatque ad Venenum ex corpore eliminandum.

Lue Venerea laborantes a Camphora, magna doſi data male habent: Spaſmis corripiuntur convulſiones minitantibus: excitatur inde in illis febris, & varia alia ſymptomata. ſi tamen in humoribus jam nata ſit putredo, his etiam prodeſt.

Plethorici Camphoram non ferunt: nocet omnibus firma ſanitate gaudentibus.

Camphoræ ſecundum Indicationem adhibitæ uſus præter jam modo dicta alias adhuc cautelas requirit.

Si magna doſis in pulvere homini detur, cujus nervi non obtuſi vel ſenſu in gravi morbo

bo privati ſunt, vix poteſt ſumere: ſi ſumat, fit ebrius, vertiginoſus & ſpaſmis corripitur: ni magnus ſit in primis viis & reliquo corpore putredinis gradus.

Camphora in nullo menſtruo perfecte ſolvitur, tantum in aliquibus deliqueſcit: Mucilaginoſis optime miſcetur.

Mucilagine involuta non ſimul & ſemel Nervos oris, œſophagi, ventriculi &c. vaſa reſorbentia afficit: ſed ſenſim extricata per oſcula vaſorum reſorbentium ſecundas vias intrat & ibi effectus ſuos edit.

Mucilago nutrit, acre demulcet, emollit, relaxat, omnia lubrica reddit: hinc majoris vel minoris conſiſtentiæ ſecundum indicationem parari debet: modo Camphoræ admixtioni ſufficiat, & ſat blandum vehiculum præbeat.

Si præſente Gangræna Pulſus ſit fortis, durus, magnus, vel præ plenitudine parvus: ſi ſanguis ſit phlogisticus, licet pulſus

ſat mollis & liber videatur, magna Camphoræ doſis teterrima mala cauſare poteſt: immo moderata hujus medicamenti doſis hominibus ſanguinem ſic conſtitutum habentibus ſubinde non ſine noxa exhibetur; licet noverit practicus Miaſma aliquod putredini in humoribus generandæ aptum cum illis circumduci.

Camphora nempe, ut relatæ obſervationes demonſtrant, nimis attenuatos & diſſolutos humores inſpiſſat, compingit &c. hinc ubi debita conſiſtentia jam gaudent, vel nimia tenacitate ad inflammatoriam vergente peccant; patet hoc medicamentum, niſi minima doſi detur, nocere debere.

Ubi urgens malum Camphoram poſcit, præſente aliquali ſanguinis ad ſpiſſitudinem inflammatoriam diſpoſitione, præmiſſa vaſorum, ſi nimis plena ſint, depletione, proportionata Nitri doſis ſimul cum Camphora exhiberi debet, quod humorum morboſam

can-

condenſationem impedit: dum Camphora deſideratos in corpore effectus edit. facile autem patet nociturum Nitrum, ſi humorum adſit diſſolutio.

Ubi pulſus debilitas, vacuitas, flacciditas &c. & alia in reſpiratione aliisque functionibus gangrænæ ſigna adſunt: ingentem Camphoræ doſin facile & ſumma cum Euphoria ſumunt Ægri, optimeque ferunt, & Miraculi inſtar ex orci faucibus cito eripiuntur.

Hi iidem Ægri, quibus magna Camphoræ doſis tam benefecit, mutata ſub ipſius continuato uſu morboſa ſanguinis craſi in conſiſtentiam quæ ſanis & robuſtis corporibus propria eſt, ab illa male afficiuntur, eamque non amplius ferunt: niſi prius depletis vaſis cum Nitro porrigatur.

Nonnulli tamen ex his magnam Camphoræ doſin diu ferunt, poſt quam cutis color, corporis robur, pulſus, reſpiratio & omnes

functiones ſanam ſolidorum fluidorumque conſtitutionem præ ſe ferunt.

Subiti, ſæpe redeuntes & plerumque cito diſparentes calores, Anxietates, capitis gravitates, Aurium tinnitus, leves vertigines, magna pulſus plenitudo monent a Camphora abſtinendum eſſe, vel minori doſi, aut addito Nitro, ſi morbi continuatio ipſius uſum neceſſarium reddat, exhibendam eſſe.

Niſi præceps periculum ſubitam opem requirat: a doſi mediocri ſemper incipiendum: immo ubi unius diei ſpatio magna doſis, v. g. dr. II. ſunt abſumendæ: præſtat ut in doſes N. viij vel plures dividatur: ſic enim Ægri facile ſumunt & bene ferunt: qui a dr. ß. una doſi ſumpta ſubinde per aliquot minuta ſpeciem Ebrietatis patiuntur & poſtea Medicamentum minus libenter ſumunt. unicum habui, qui, ne tam ſæpe illud ſumere deberet, ſine incommodo diu dr. I. pro doſi, id eſt triparti-

ta

ta doſi dr. III. Camphoræ quotidie abſumpſit. raro autem, credo, invenientur, qui tantam doſin uno hauſtu abſque incommodo ſumere poſſint. videntur dr. II. per diem contra peſſimas externas gangrænas, quæ jam ſanguinis maſſam infecerunt, ſufficere: immo dr. I. ß. dr. I, quotidie aſſumpta ſæpe votis ſatisfaciunt.

Si vero pars interna gangræna jam ſit deſtructa: tabus putridus in cavitates extra circulationis limites effuſus omnia peſſumdat: & ſi per injectiones ad illa loca pervenire nequeat Camphora, lethalis putredinis effectus per os aſſumpta impedire nequit: poteſt tamen ſanguinis putridam diſſolutionem remorando vitam prolongare.

Injici poteſt Camphora Mucilagini mixta in inteſtina, in uterum, & in ſinus omnes: ad quos patet aditus: ſicque optimos effectus edit: ad parandam mucilaginem injectionibus deſtinatam ſufficiunt ſcr. II. dr. ß.

ſcr. I. gumm. arabici ad aquæ unc. I. cui deinde major vel minor Camphoræ doſis pro ratione magnitudinis mali admiſcetur: ita tamen ut ſemper attente obſervet Medicus, quomodo ferat Æger.

Dum Mucilago externis Ulceribus applicatur, ſi emolliendum, relaxandum eſt, & magna ſubſtantiæ facta fuerit conſumptio, paulo ſpiſſior paranda eſt: ſi contrarium obtineat, dilutior fieri debet & ſecundum indicationem Camphora magis ſaturari.

Ubi excreſcentiæ hinc inde in Ulceribus adſunt, vel tota Ulceris ſuperficies ſupra margines nimis excreſcere videtur, præſtat ſiccum applicare Camphoræ pulverem. parva tamen elevatio non eſt timenda: cicatrix enim ab omni ambitu accedens omnia æqualia reddit. poteſt in tali caſu applicari Mucilag. Camphora magis ſaturata.

Dum pulvis Camphoræ externe applicatur, debet digitis tritus Ulceribus inſpergi:

in

in pixide enim aſſervatus cito in moleculas coit, quæ Ulceribus applicatæ corpora irritantia ſunt, & cicatricem impediunt. Ubi excreſcentiæ magnæ ſunt, ſolus pulvis Camphoræ ſuperpoſitis plumaceolis ſiccis applicandus eſt.

Si pulvis Camphoræ ad fungoſas excreſcentias conſumendas non ſufficiat, Camphora ſpiritui Nitri forti ad perfectam ſaturationem mixta in oleum deliqueſcit, & leniſſimum dat Eſcharoticum cruſtam mollem faciens, qua aliquoties ablata, fungoſitas conſumitur: & continuata dein pulveris Camphoræ applicatione Ulcus cicatrice obducitur.

Externus Camphoræ uſus locum habet ſemper & ubicumque gangræna adeſt: ſi ſicca eſt, mucilagini mixta tepefacta applicari debet: ſi humida denſum pulveris ſtratum inſpergitur, & pro ratione indicationis, vel

ſic-

ſicca plumaceola, vel mucilagine camphorata impraegnata ſuperponuntur.

Hæc nunc de Camphora: dabitur, credo, poſtea iterum occaſio de hoc medicamento quædam dicendi.

FORMULÆ.

N. I. ℞. Gumm Arabic. dr. I. ſolve in aq. Flor. Tiliæ unc. III. dein terendo admiſce.

Camphor dr. ß.

Syr. Capill vener. unc. I.

M.

S. Quater de die unc. I. detur ſuperpotando vaſculum Emulſi vel Decocti alicujus.

vel

℞. Amygdal dulc. dr. III.

Fiat c aq. pur. L. A. Emulſio colat. unc. III. adde terendo

Cam-

Camphor. dr. ß.

Syr. capill vener. unc. I.

M.

S. uſus ut prioris

vel.

℞. Sacchar Candi dr. vj.

Solve in aq. pur. unc IV.

Dein terendo admiſce Camphor dr. ß.

d. u.

S. Uſus ut prioris

N. 2. ℞. Gumm Arabic dr. II.

Solve in aq. pur. unc. II. ß. adde terendo. Camphoræ dr. I.

Syr Althæ. unc. I. ß.

M.

S. diviſis doſibus uno die abſumat.

vel.

℞. Aq. flor. Tiliæ unc. v.

Specier diatragac frigid dr. I. ß.

Cam-

Camphor. terendo admixtæ dr. I.
Syr. Diacod. unc. I.
M.
S. uſus ut prioris.

N. 3. ℞. Gumm. Arabic dr. II.
Solve in aq. flor. Tiliæ unc. II.
adde terendo
Camphor dr. I. ß.
Syr Althæ, unc, II.
M.
S. diviſis doſibus uno die abſumat.

vel

℞. Rad. Saleb dr. I. ß.
Coq. c. aq. q. s. p. $\frac{1}{4}$. hor.
Colat unc. x. adde terendo.
Camphor dr. I. ß.
Syr. flor. Rhæad. unc. II.
M.
S. uſus ut prioris

N. 4. ℞. Mucilagin. Gum. Arabic. unc. II.

Cam-

Camphor terendo admixtæ dr. II.
Syr. Althæ unc. II. ß.
M.

S. diviſis doſibus diei unius ſpatio abſumat.

vel.

℞. Amygdal. dulc. unc. I. ß.
Fiat cum aq. pur. L A.
Emulſio: colat unc. IV. adde terendo Camphor. dr. II.
Syr. Capill. vener. unc. II.
M.

S. uſus ut prioris.

N. 5. ℞. Mucilag. Gumm. Arabic lib. I.
Camphor terendo admixtæ unc. I. ß.
d. u.

Huic vaſe clauſo tepefactæ intinguntur Plumaceola & lintea pro deligatione.

vel.

vel.

℞. Mucilag. Gumm. Arabic lib. I.
Camphor terendo additæ unc. III.

d. u.

S. uſus ut prioris

vel.

℞. Mucilag Gumm. Arabic unc. vj.
Camphor unc. II.
Diligenter terendo miſceantur.

d. u.

S. uſus ut prioris.

N. 6. ℞. Gumm. Arabic. unc. j.
Solve in Aq. pur. lib. j.
Dein terendo admiſce
Camphor. unc. ß.
d. pro Enemate
Tepide injiciendo.

Quivis videt hasce formulas facili opera multipliciter variari poſſe.

FINIS.